

Las ovejas que están secas y recién cubiertas en pastos de raigrás y trébol de 5 cm. de altura, mantienen su peso y condición corporal, mientras que en pastos con hierba de 8 cm. ganan de 80 a 100 gramos por día y obviamente mejoran la condición corporal.

La fertilidad y la prolificidad incrementan cuando las variaciones de peso y condición corporal son favorables en el período de cubriciones.

CONCLUSIONES

- La productividad por hectárea del ovino es alta.
- El manejo del rebaño es sencillo.
- Las necesidades de suplementación son pequeñas.
- Demanda poca infraestructura y barata.

Estas recomendaciones son fruto de proyectos de investigación desarrollados en el CIATA por la Consejería de Agricultura en cofinanciación con el INIA y otros organismos

Para más información, consulte en los Servicios Técnicos de la Consejería de Agricultura.



PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE AGRICULTURA

DIRECTORIO DEL CIATA

Oviedo

Oviedo C/ Coronel Aranda n° 2. 33005 Oviedo
Telf. (98) 510 57 02. Fax (98) 510 55 17

Villaviciosa

Villaviciosa Apdo. 13. 33300 Villaviciosa
Telf. (98) 589 00 66. Fax (98) 589 18 54

Grado

Grado Apdo. 13. 33820 Grado
Telf. (98) 57.5 00 97. Fax (98) 575 08 28

Gijón

Centro de Selección y Reproducción Animal

Apdo. 150. Somió. 33203 Gijón
Telf. (98) 536 25 33. Fax (98) 536 11 27

Laboratorio de Sanidad Animal Jove.

33299 Gijón
Telf. (98) 532 77 51. Fax (98) 532 78 11



PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE AGRICULTURA

PRODUCCION DE CARNE DE OVINO EN PASTOREO



DIRECCION REGIONAL DE GANADERIA Y AGRICULTURA

Centro de Investigación Aplicada y Tecnología Agroalimentaria

Aunque la tendencia parece estar mejorando, el ganado ovino no tiene en Asturias la estima que se merece, si atendemos a criterios objetivos de rentabilidad y facilidad de manejo.

Las ovejas tienen un periodo de lactación corto, de 4 a 5 meses, apenas tienen partos difíciles, la carne de cordero tiene buen mercado y, en proporción, el precio de la oveja es considerablemente inferior al de una vaca.

Se puede manejar un número importante por hectárea, son animales resistentes, los tratamientos son preventivos y rutinarios y las necesidades de inversión en infraestructura son mínimas, sencillas y baratas.

Recibe las primas más altas teniendo en cuenta la diferencia en el número de animales que se pueden manejar por unidad de superficie.

Las ovejas presentan una conducta de pastoreo bastante diferente de las vacas, son más selectivas y maximizan las ganancias con menores cantidades de hierba disponible. Por lo tanto, es preciso planificar adecuadamente el pastoreo del ganado ovino para mantener un pasto de calidad y maximizar la producción ovina por unidad de superficie a lo largo de los años.

A tal efecto, la Consejería de Agricultura ofrece a los ganaderos interesados esta guía en la que se recogen las recomendaciones básicas para el manejo del pastoreo de ovejas de cría en praderas mejoradas con raigrás y trébol.

ÉPOCA DE PARTO ADECUADA

Entre 15 y 45 días antes del inicio del pastoreo:

- Del 15 de enero al 15 de febrero en zonas bajas.

- Del 15 de febrero al 15 de marzo en zonas de media montaña.



El potencial de las praderas asturianas garantiza, con una adecuada planificación y manejo, la rentabilidad de la producción de ovino

MANEJO DEL PASTOREO DE PRIMAVERA

Las ovejas y sus corderos han de disponer de un pasto de unos 5 a 5,5 centímetros de altura en la primera mitad del pastoreo de primavera. En la segunda mitad se incrementará la altura de la hierba disponible a 7 cm. con el fin de que los corderos mantengan ganancias de 200 gramos por día o superiores.

Mayores disponibilidades de hierba que las mencionadas significan, por un lado, pérdidas de calidad del pasto y, consiguientemente, las ganancias de los corderos se reducen y, por otro, se traducen en un menor número de animales por unidad de superficie con pérdidas de eficiencia y rentabilidad.

Alturas de pasto inferiores a las indicadas como adecuadas suponen reducciones en las ganancias diarias de los corderos y pérdidas de peso y condición corporal en las ovejas.

DESTETE

Los corderos se destetan con 4 o 5 meses de edad, a mediados de junio o julio según se manejen en zonas bajas o de media montaña, respectivamente.

El peso de los corderos suele ser de 10 a 14 kilogramos canal (unos 25 a 35 Kg. peso vivo).

Se obtendrán unos 40 corderos por hectárea en zonas bajas adecuadamente abonadas y manejadas y unos 25 a 30 en zonas de media montaña.



Canales de corderos de 4 meses de edad manejados en pastoreo con sus madres