

Frecuentación hospitalaria por

INTENTOS DE SUICIDIO

en Asturias 1996 - 2013

P. Margolles (UNED); M. Margolles, I. Donate Suárez (Consejería de Sanidad de Asturias)



CONCLUSIONES

Entre 1996 - 2013 los intentos aumentan en Asturias. Los resultados son coherentes con una hipótesis de correlación de incremento de casos en épocas agudas de la crisis, con el tipo de personas afectadas por la misma y con los lugares más castigados.

INTRODUCCION

El intento suicida es el aquel acto autodestructivo con un grado diferente de intención de morir en el que su resultado final no alcanza la muerte. El objetivo de este estudio es conocer la magnitud y evolución de los intentos de suicidio en una comunidad en crisis social y económica como es Asturias.



METODO



SOLICITUD "CMBD"

Se solicita a la Consejería del Principado el Conjunto mínimo básico de datos de las altas del periodo (18 años) por intento de suicidio (Códigos E950-E959 de la CIE-9-MC).



ESTUDIO DESCRIPTIVO

Se realiza un estudio descriptivo de los datos. Se analizan las variables año, edad, sexo, tipo de suicidio y lugar de residencia (municipio, Área Sanitaria y código postal).



COMPARACIÓN DE VARIABLES

Se comparan variables entre sí mediante el programa SPSS, distribuciones espaciales mediante GVSig y tendencias con regresión Joint Point.



RESULTADOS

5005 tentativas de suicidio con hospitalización en el total del periodo (2246 hombres, 2758 mujeres).


Media anual 278 casos (2x respecto a suicidios consumados).

Más mujeres que hombres (Tasa de masculinidad 0,9 respecto a 3 en suicidios consumados).

Más frecuente en zonas rurales aisladas, declive industrial y barrios obreros.

De todos los intentos fallecen finalmente un 3%.

Mayor frecuencia 20-44 años (pico 30-44 años), mínimas tasas tercera edad (sólo un 13% en mayores de 65 años), 65 casos infantiles (54 mujeres, 11 hombres).



INTENTOS DE SUICIDIO SEGÚN SEXO

Los intentos más frecuentes se realizan mediante barbitúricos y psicofármacos (70%), instrumentos cortantes y punzantes (11%) y por precipitación (5%). Los hombres prefieren métodos más cruentos mientras que en mujeres es más frecuente el uso de barbitúricos y ahogamiento.



EVOLUCIÓN DE LAS HOSPITALIZACIONES

Se demuestra un incremento constante de las hospitalizaciones por intento de suicidio en Asturias a lo largo del periodo. Desde 2009 el incremento es muy manifiesto (en un 80%) con mayor pendiente en mujeres y en el grupo etario 20-64 años.

RECIBE EL ARTICULO COMPLETO EN TU EMAIL



bit.ly/1shfoUp

Datos de contacto: pedromargolles@neosciencia.com
marionmargolles@gmail.com
www.neosciencia.com
www.asturias.es
Twitter: @pedromargolles

Agradecimiento especial a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias por facilitarnos los datos que hicieron posible este estudio. Los autores declaran que no hay conflictos de interés.