




# Atención maternal y neonatal

## I Encuesta de opinión



**INFORME PARCIAL**

**HOSPITAL DE JARRIO**

**Noviembre 2010**

**Grupo de trabajo de elaboración del cuestionario y diseño del estudio:**

Álvarez Iglesias, Gema. Socióloga. Área de Promoción de la Salud y Participación. DGSP  
Bruno Bárcena, Julio. Médico. Área de Promoción de la Salud y Participación. DGSP  
Donate Suárez, Ignacio. DUE. Servicio de Salud Poblacional. DGSP  
García González, M<sup>a</sup> Carmen. Médica. Servicio de Salud Poblacional. DGSP  
Muslera Canclini, Elvira. Licenciada en Económicas. Unidad de Análisis y Programas. SESPA  
Uría Urraza, M<sup>a</sup> Angeles. Socióloga. Instituto Asturiano de la Mujer

**Extracción de bases de datos hospitalarias:**

Díaz Pérez, Sonia. Área de Sistemas de Información. SESPA.  
Martínez Noval, José Antonio. Área de Sistemas de Información. SESPA.

**Explotación y análisis estadístico:**

Área de Consultoría y Estudios de COTESA (Grupo Tecopy)

**Análisis de resultados, elaboración y redacción del Informe final**

Bruno Bárcena, Julio. Médico. Área de Promoción de la Salud y Participación. DGSP  
García González, M<sup>a</sup> Carmen. Médica. Servicio de Salud Poblacional. DGSP  
Uría Urraza, M<sup>a</sup> Angeles. Socióloga. Instituto Asturiano de la Mujer

**Apoyo administrativo**

Casal Iglesias, María Ángeles. Secretaria General Técnica  
Carretero de Lama, Rosa María. Área de promoción de la Salud DGSP

**Coordinación y dirección del proyecto:**

Julio Bruno Bárcena. Área de Promoción de la Salud y Participación

---

**Promueve: Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias**

**Edita: Dirección General de Salud Pública y Participación. Consejería de de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias. Web : <http://www.astursalud.es>**

**Para citar este estudio:**

Bruno Bárcena, J; Uría Urraza, M A; García González, MC; Donate Suárez, I; Muslera Canclini, E; Álvarez Iglesias, G. Atención maternal y neonatal. I Encuesta de opinión. Consejería de Salud y Servicios Sanitarios. Principado de Asturias. 2010. [www.astursalud.es](http://www.astursalud.es)

**FINANCIACIÓN:**

Este trabajo ha sido realizado en el marco de las subvenciones reguladas por el RD 924 de 29 de mayo del 2009 del Ministerio de Sanidad y Política Social para la Estrategia de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

<b>1. DEFINICIÓN DEL ESTUDIO .....</b>	<b>1</b>
<b>2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO .....</b>	<b>2</b>
<b>3. PLAN DE INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA .....</b>	<b>3</b>
<b>4. MUESTRA ENCUESTADA. ANÁLISIS DE REPRESENTATIVIDAD DEL TRABAJO .....</b>	<b>5</b>
<b>5. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA MUESTRA .....</b>	<b>6</b>
<b>6. EXPLOTACIÓN CUANTITATIVA DE LA INFORMACIÓN .....</b>	<b>11</b>
SECCIÓN A: Resultado del parto y nacimiento .....	12
SECCIÓN B: La atención durante el embarazo.....	20
SECCIÓN C: El parto y el nacimiento de la criatura.....	38
SECCIÓN D: Atención en el hospital después del parto .....	62
SECCIÓN E: Cuidados especiales de la criatura .....	67
SECCIÓN F: La alimentación de la criatura.....	71
SECCIÓN G: Valoración global de la atención.....	79
<b>7. ANEXO: CUESTIONARIO .....</b>	<b>83</b>

## 1. DEFINICIÓN DEL ESTUDIO

La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias a través de la Dirección General de Salud Pública y Participación desarrolla un proyecto de investigación con el objetivo de conocer la situación actual de las prácticas clínicas, el nivel de información, participación y satisfacción de las mujeres asturianas respecto a los procesos de parto y nacimiento en el periodo de referencia acotado entre la segunda mitad de 2008 y el primer semestre de 2009.

Este documento representa el Informe Final relativo a la *Encuesta de opinión sobre Atención maternal y neonatal en el Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias*, circunscrito al **Hospital de Jarrío**.

La información que se investiga comprende ocho grandes grupos de información que pretenden abarcar el mayor número posible de ópticas en relación al fenómeno estudiado con el fin de obtener una visión completa sobre el mismo.

La opinión vertida en los cuestionarios por las usuarias actuará como variable definitoria de la evaluación de la calidad del servicio materno-infantil en la sanidad pública, siendo base para fundamentar futuras actuaciones en esta materia encaminadas a la mejora de la atención en el proceso de parto y puerperio y el consiguiente incremento de la satisfacción de las madres asistidas.

## 2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo básico perseguido es el conocimiento de la percepción que tienen las mujeres usuarias de los servicios de obstetricia y neonatología del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias en el Hospital de Jarrow en relación a un conjunto de aspectos relacionados con su proceso de embarazo, parto y nacimiento.

La información que se solicita en el cuestionario se encuentra estructurada en los siguientes bloques temáticos, permitiendo alcanzar los fines para los que se lleva a cabo esta investigación.

- ❑ Sección A: Resultado del parto y nacimiento
- ❑ Sección B: La atención durante el embarazo
- ❑ Sección C: El parto y el nacimiento de la criatura
- ❑ Sección D: Atención en el Hospital después del parto
- ❑ Sección E: Cuidados especiales de la criatura
- ❑ Sección F: La alimentación de la criatura
- ❑ Sección G: Valoración global de la atención
- ❑ Sección H: Usted y su familia

## 3. PLAN DE INVESTIGACIÓN. METODOLOGÍA

Los aspectos técnicos definitorios del estudio desarrollado son los siguientes:

- El **ámbito geográfico** de este estudio se encuentra constituido por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
- Las **unidades de información** son las mujeres que han parido en el Hospital de Jarrow tomando como referencia la fecha límite de 30 de junio de 2009 y añadiendo usuarias hasta completar la muestra deseada; abarcando en este caso hasta el segundo semestre de 2008.



- El **ámbito temporal** que ha comprendido el proceso de recogida de información se fecha de 9 a 22 de diciembre de 2009.
- El **método de recogida de información** empleado es el denominado CATI (corresponde a las siglas Computer Asiste Telephone Interviewing); es decir; se trata de encuestas telefónicas asistidas por ordenador.  
Además, se habilitaron un conjunto de medios alternativos para la realización y recepción de las encuestas:
  - ⇒ **Fax gratuito:** 900 878 736
  - ⇒ **Correo electrónico:** [encuestasatisfaccinatencionalparto@grupotecopy.es](mailto:encuestasatisfaccinatencionalparto@grupotecopy.es)
  - ⇒ **Página Web:** [http://www.grupotecopy.es/encuesta\\_asturias/index.html](http://www.grupotecopy.es/encuesta_asturias/index.html)
  - ⇒ **Encuesta por correo ordinario**
- El **diseño muestral de** la investigación es de tipo estratificado semiprobabilístico. Consta de 2 etapas de estratificación. La primera de ella emplea como variable de segmentación los ocho Hospitales Públicos escogidos para formar parte de la investigación. La muestra total se encuentra distribuida entre estos hospitales de un modo proporcional al número de partos que hubo en cada uno de ellos durante el periodo considerado como de referencia. Al mismo tiempo se busca la representatividad de la muestra respecto a la variable edad, cumpliendo también criterios de proporcionalidad respecto a la población de referencia.
- Distribución de la muestra para el Hospital:

HOSPITAL	TOTAL PARTOS 01/07/2008 a 30/06/2009	MUESTRA	% MUESTRA SOBRE PARTOS	REPARTO MUESTRA %
HOSPITAL DE JARRIO	331	204	61,63 %	6,27 %
TOTAL	7.488	3253	43,44 %	100 %

- El **tamaño muestral** para el Hospital de Jarrío es de 204 encuestas; cifra que supone para un nivel de confianza del 95 % (en el supuesto de las condiciones más desfavorables  $p=q=0,5$ ) un error de muestreo inferior al 5 %.



#### 4. MUESTRA ENCUESTADA. ANÁLISIS DE REPRESENTATIVIDAD DEL TRABAJO

La muestra global definitiva del estudio se encuentra formada por 3.253 registros. Dentro de este informe se tendrán en cuenta además de los datos generales, los resultados individuales para el Hospital de Jarrío.

El estudio estructural de la muestra finalmente obtenida en función de las dos variables de muestreo (grupo de edad y Hospital de referencia), lleva a la aplicación de un factor ponderador respecto de esta segunda para los datos globales, como medida que corrija los efectos metodológicos empleados para la obtención de las muestras. Los datos origen para el cálculo del factor de ponderación han sido aportados por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) en relación a los partos en cada uno de los Hospitales del Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias entre el 1/07/2008 y el 30/06/2009 aportada por el.

En concreto, el factor de ponderación aplicado es el siguiente:

$$\left( \frac{\left( \frac{N_i}{N_t} \right)}{\left( \frac{n_i}{n_t} \right)} \right)$$

Ni= número de mujeres que hay en cada área sanitaria

Nt= número de mujeres que hay en la población de referencia

ni= número de mujeres que hay en cada estrato de la muestra de cada área

nt=número total de mujeres que componen la muestra

De esta forma, los resultados particulares para el Hospital de Jarrío serán presentados sin la aplicación del factor ponderador. Sin embargo, los resultados comparativos referentes al conjunto de la muestra, sí estarán calculados con dicho estadístico, eliminando de este modo sesgos en el estudio de los datos.

La utilización de un factor de ponderación en la obtención de los resultados definitivos de la encuesta supone la aplicación de elementos decimales a los pesos de las distintas opciones de respuesta de cada una de las preguntas. El programa estadístico empleado para la explotación estadística de la encuesta (SPSS 15); emplea estos factores decimales en su proceso de trabajo. Así, por un lado toma el factor ponderador para realizar el cálculo de los resultados; si bien, muestra estos resultados en términos de números enteros (en la columna de frecuencias).

Como consecuencia de estas dos operativas, pueden darse casos en que el resultado total que se visualiza no coincide con el correspondiente a la suma de las frecuencias parciales, creándose pequeñas diferencias ( $\pm 1$  elemento); no significando en ningún caso que se hayan añadido o quitado elementos muestrales a esa cuestión; sino siendo consecuencia de la operación estadística realizada por el programa.



## 5. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LA MUESTRA

La definición del perfil sociodemográfico de las usuarias de Asturias correspondientes al Hospital de Jarrío viene marcada por el conjunto de variables que se muestran a continuación:

### ■ EDAD

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	De 15 a 19 años	3	1,5	1,5	1,5
	De 20 a 24 años	19	9,3	9,3	10,8
	De 25 a 29 años	43	21,1	21,1	31,9
	De 30 a 34 años	87	42,6	42,6	74,5
	35 y más años	52	25,5	25,5	100,0
	Total	204	100,0	100,0	

Tabla 1: Distribución de las usuarias según su edad

La distribución de las mujeres que parieron en el Hospital de Jarrío en función de su edad es ligeramente más joven que la obtenida para el conjunto de la muestra, ya que, las mujeres totales de 35 años o más representan el 30 %, mientras que en el caso de Jarrío forman el 25,5%.

### ■ NIVEL DE ESTUDIOS

Estratos definidos para el estudio de la variable:

#### 1. Hasta primarios:

- Sin estudios o estudios primarios incompletos: menos de 6 años o cursos de primaria aprobados.
- Estudios primarios completos: 6º EGB aprobado, Certificado escolaridad, 6 años o cursos de primaria aprobados.

#### 2. Medios:

- Estudios secundarios 1ª etapa: 8º EGB aprobado, Graduado Escolar, Bachillerato Elemental, Formación Profesional de 1º Grado o Ciclos Formativos de Grado medio Aprobados, ESO aprobada, 4 años o cursos de secundaria aprobados.
- Estudios secundarios 2ª etapa: BUP, Bachillerato Superior, Bachillerato LOGSE, COU, Preu, Formación Profesional 2º Grado o Ciclos Formativos de Grado Superior, 5 o más cursos de secundaria aprobados.

#### 3. Universitarios:

- Estudios universitarios medios: Diplomatura, Magisterio, Arquitectura o Ingeniería Técnica.
- Estudios universitarios superiores: Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería Superior, Doctorado.





		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Hasta primarios	19	9,3	9,4	9,4
	Medios	115	56,4	56,9	66,3
	Universitarios	68	33,3	33,7	100,0
	Total	202	99,0	100,0	
	Ns/Nc	2	1,0		
Total		204	100,0		

Tabla 2: Distribución de las usuarias según su nivel de estudios

La mayor diferencia en el nivel de estudios entre el Hospital de Jarrío y los datos globales radica en las universitarias que forman el 39,7 % de las mujeres que dieron a luz en los hospitales de Asturias, frente al 33,7 % de las mujeres que fueron atendidas en Jarrío.

## ■ ESTADO CIVIL

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Soltera	9	4,4	4,4	4,4
	Casada	155	76,0	76,0	80,4
	Vive en pareja	38	18,6	18,6	99,0
	Viuda	2	1,0	1,0	100,0
	Total	204	100,0	100,0	

Tabla 3: Distribución de las usuarias según su estado civil

El porcentaje de mujeres casadas que han dado a luz en el Hospital de Jarrío es del 76 %, suponiendo casi 5 puntos porcentuales por encima del correspondiente a las mujeres casadas de los datos globales de este estudio, (71,5%).

## ■ PAÍS ORIGEN

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	España	185	90,7	90,7	90,7
	Otro	19	9,3	9,3	100,0
	Total	204	100,0	100,0	

Tabla 4: Distribución de las usuarias según su nacionalidad

La distribución de las madres del Hospital de Jarrío respecto a su nacionalidad es muy similar a la presentada por el conjunto de los hospitales, representando en ambos casos la nacionalidad española en torno al 90 %.



Entre las mujeres que pertenecen a otro país destacan aquellas procedentes de Brasil, Portugal, Paraguay y Rumanía, siendo en su mayoría menor de 5 años el tiempo que han transcurrido viviendo en España.

## ■ MUNICIPIO DE EMPADRONAMIENTO

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Municipio del Área Sanitaria	158	77,5	77,5	77,5
	Municipio fuera del Área Sanitaria	46	22,5	22,5	100,0
	Total	204	100,0	100,0	

Tabla 5: Distribución de las usuarias según su municipio de empadronamiento

La distribución de la variable relativa a la pertenencia del municipio de empadronamiento al Área Sanitaria es del 77,5 % para el Hospital de Jarrio, frente al 92,3 % del total de Asturias.

## ■ TAMAÑO DEL MUNICIPIO

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Menos de 3.000 hab.	16	7,8	7,8	7,8
	Entre 3.000 y 24.999 hab.	158	77,5	77,5	85,3
	Entre 25.000 y 79.999 hab.	8	3,9	3,9	89,2
	80.000 hab. o más	22	10,8	10,8	100,0
	Total	204	100,0	100,0	

Tabla 6: Distribución de las usuarias según el tamaño de su municipio de empadronamiento

En base a los datos mostrados en la tabla, las mujeres atendidas por este servicio en Jarrio pertenecen a municipios entre 3.000 y 24.999 habitantes en su mayoría (77,5 %), marcando una clara diferencia respecto a los datos globales (25,6 %). Esta información da idea de la importancia de estos núcleos para el Área de referencia.

No todas las usuarias tienen fijada su residencia en el Principado de Asturias, ya que un 4 % residen en la Comunidad Autónoma de Galicia y un porcentaje inferior pertenecen a otras regiones.

## ■ SITUACIÓN DE EMPLEO

**En activo:** Trabajando, Trabajando con baja de tres meses o más, en desempleo.



	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	En activo	159	77,9	77,9
	Estudiante	1	,5	78,4
	Trabajo doméstico no remunerado	37	18,1	96,6
	Trabajos sociales no remunerados	1	,5	97,1
	Otras	6	2,9	100,0
	Total	204	100,0	100,0

Tabla 7: Distribución de las usuarias según su situación laboral

La situación en el mercado de empleo se caracteriza por un considerable porcentaje de personas que dan a luz y que desempeñan un trabajo profesional. Los datos muestran que el 77,9 % de mujeres en Jarrío se encuentran en activo, mientras que en los datos globales esta cifra alcanza el 84,6 %.

#### ■ OCUPACIÓN/SITUACIÓN LABORAL

Todos aquellos casos en que la encuestada era estudiante, la ocupación se refería a la persona principal del hogar. Si se estaba buscando empleo, la cuestión era referente a la última ocupación. Las mujeres con trabajos no remunerados (domésticos o sociales) no respondieron a esta pregunta.

La asignación para esta variable ha sido:

##### 1. Trabajador por cuenta propia:

- Trabajador por cuenta propia sin asalariados/as; con menos de 10 asalariados/as; con más de 10 asalariados/as.

##### 2. Gerente de empresa:

- Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados/as; con más de 10 asalariados/as

##### 3. Capataz, supervisora o encargada:

- Capataz, supervisora o encargada

##### 4. Otro tipo de asalariado

- Otro tipo de asalariado



		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Trabajador por cuenta propia	34	16,7	21,5	21,5
	Gerente de empresa	2	1,0	1,3	22,8
	Otro tipo de asalariado	122	59,8	77,2	100,0
	Total	158	77,5	100,0	
	Ns/Nc	46	22,5		
Total		204	100,0		

Tabla 8: Distribución de las usuarias según su ocupación

En este caso, el 77,2 % de las mujeres de Jarrío indicaban que su ocupación actual se basa en trabajar como asalariado de forma distinta a los autónomos, capataces y gerentes de empresa. Este dato supone una diferencia con respecto al 86,3 % correspondiente al total de las mujeres en el Principado de Asturias que respondieron de la misma forma a esta cuestión.

## 6. EXPLOTACIÓN CUANTITATIVA DE LA INFORMACIÓN

El presente epígrafe contiene los resultados relativos a la explotación estadística de la información recopilada en el trabajo de campo, datos relativos a las valoraciones emitidas en la *Encuesta de opinión sobre Atención maternal y neonatal en el Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias*,

De este modo se muestran los resultados y conclusiones más significativas y relevantes que se desprenden de la encuesta telefónica realizada a las mujeres que dieron a luz en el **Hospital de Jarrío** durante el periodo de referencia **en comparativa con los resultados obtenidos del conjunto de la investigación** (total del Principado de Asturias).

Los resultados para el Hospital de Jarrío son de tipo muestral mientras que los globales se encuentran transformados tras la aplicación del factor de ponderación.

En ambos casos estos datos han sido plasmados en tablas y gráficos de frecuencias, tablas de contingencia; y todas aquellas otras pruebas o formas de representar la información que se consideran necesarias para la adecuada presentación y análisis de los datos.


**SECCIÓN A: RESULTADO DEL PARTO Y NACIMIENTO**
**p\_00. Tipo de parto**
 **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Parto vaginal	170	83,3	83,3	83,3
	Parto por cesárea	34	16,7	16,7	100,0
	Total	204	100,0	100,0	

Tabla 9: Tipo de parto, Hospital de Jarrow

 **Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Parto vaginal	2622	80,6	80,6	80,6
	Parto por cesárea	631	19,4	19,4	100,0
	Total	3253	100,0	100,0	

Tabla 10: Tipo de parto

Si se tiene en cuenta exclusivamente las respuestas de las mujeres del Hospital del Jarrow, el 83,3 % tuvieron un parto vaginal, cuando en el total de los hospitales públicos del Principado de Asturias el 80,6 % fueron partos vaginales. El restante 16,7 %, del centro médico de Jarrow, y 19,4 % son los partos producidos por cesárea en cada área.

Es posible realizar un análisis más exhaustivo de los partos vaginales, para lo que se ha empleado la siguiente categorización: parto vaginal natural, utilizando fórceps o utilizando ventosa o paleta cuyos resultados son éstos.

 **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Natural	142	83,5	83,5	83,5
	Utilizando fórceps	3	1,8	1,8	85,3
	Utilizando una ventosa o paleta sobre la cabeza del bebé	25	14,7	14,7	100,0
	Total	170	100,0	100,0	

Tabla 11: Distribución de los partos vaginales, Hospital de Jarrow



### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Natural	1941	74,0	74,0	74,0
	Utilizando fórceps	96	3,7	3,7	77,7
	Utilizando una ventosa o paleta sobre la cabeza del bebé	585	22,3	22,3	100,0
	Total	2622	100,0	100,0	

Tabla 12: Distribución de los partos vaginales

En este caso, de las mujeres que tuvieron un parto vaginal en Jarrío, el 83,5 % dieron a luz de forma natural, mientras que para la totalidad de las mujeres fue el 74 %.

En cuanto a los partos que fueron mediante cesárea, también es posible obtener una distribución más específica:

### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Programada	16	47,1	47,1	47,1
	No programada, se decidió después de llegar al Hospital	18	52,9	52,9	100,0
	Total	34	100,0	100,0	

Tabla 13: Distribución de los partos por cesárea, Hospital de Jarrío

### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Programada	249	39,4	39,4	39,4
	No programada, se decidió después de llegar al Hospital	382	60,6	60,6	100,0
	Total	631	100,0	100,0	

Tabla 14: Distribución de los partos por cesárea

En el Hospital de Jarrío la programación se acerca más al 50 % que en los resultados globales, formando el 47,1 % las cesáreas realizadas que estaban programadas, mientras el restante 52,9 % no estaban previstas. Por tanto, la incidencia en la programación de la cesárea es más significativa para las mujeres que dieron a luz en Jarrío que para los datos totales.

Como complemento a esta información se expone el tipo de anestesia con la que fueron realizadas las cesáreas.



### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Con anestesia general	9	26,5	28,1	28,1
	Con anestesia epidural	23	67,6	71,9	100,0
	Total	32	94,1	100,0	
Ns/Nc		2	5,9		
Total		34	100,0		

Tabla 15: Tipo de anestesia empleada en las cesáreas, Hospital de Jarrío

### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Con anestesia general	91	14,5	15,2	15,2
	Con anestesia epidural	510	80,8	84,8	100,0
	Total	601	95,3	100,0	
Ns/Nc		29	4,7		
Total		631	100,0		

Tabla 16: Tipo de anestesia empleada en las cesáreas

En la gran mayoría de las ocasiones la anestesia empleada para las cesáreas fue de tipo epidural, en Jarrío se utilizó en un 71,9 % de las ocasiones, mientras en los hospitales de Asturias se empleó en el 84,8 % de las cesáreas.

### p\_01. Con respecto a este último parto:

#### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Fue a su tiempo	142	69,6	71,4	71,4
	Fue prematuro espontáneo	19	9,3	9,5	80,9
	Se adelantó y me lo provocaron	11	5,4	5,5	86,4
	Fue un retraso espontáneo	20	9,8	10,1	96,5
	Se retrasó y me lo provocaron	7	3,4	3,5	100,0
	Total	199	97,5	100,0	
Ns/Nc		5	2,5		
Total		204	100,0		

Tabla 17: Tiempo en el que se produjo el parto, Hospital de Jarrío



### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Fue a su tiempo	1929	59,3	61,1	61,1
	Fue prematuro espontáneo	503	15,5	15,9	77,0
	Se adelantó y me lo provocaron	239	7,3	7,6	84,6
	Fue un retraso espontáneo	312	9,6	9,9	94,5
	Se retrasó y me lo provocaron	175	5,4	5,5	100,0
	Total	3158	97,1	100,0	
Ns/Nc		95	2,9		
Total		3253	100,0		

Tabla 18: Tiempo en el que se produjo el parto

Como queda patente en los resultados obtenidos, la consecución del parto en las fechas en que éste estaba previsto es más habitual en Jarrío con el 71,4 % que en los datos totales con 61,1 % de las veces.

Esta variable puede recodificarse de acuerdo a las tres opciones de respuesta principales, quedando la distribución en este caso de la siguiente manera:

### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	A término	142	69,6	71,4	71,4
	Pretérmino	30	14,7	15,1	86,4
	Postérmino	27	13,2	13,6	100,0
	Total	199	97,5	100,0	
Ns/Nc		5	2,5		
Total		204	100,0		

Tabla 19: Tiempo en el que se produjo el parto, Hospital de Jarrío

### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	A término	1929	59,3	61,1	61,1
	Pretérmino	742	22,8	23,5	84,6
	Postérmino	487	15,0	15,4	100,0
	Total	3158	97,1	100,0	
Ns/Nc		95	2,9		
Total		3253	100,0		

Tabla 20: Tiempo en el que se produjo el parto





En la tabla de frecuencias del Hospital de Jarrow no se aprecian diferencias entre la proporción de los partos que fueron antes y los que fueron después de tiempo, formando respectivamente el 15,1 % y el 13,6 %. Sin embargo, en los datos de la totalidad de las mujeres, el 23,5 % dieron a luz antes de tiempo y el 15,4 % se atrasó de la fecha prevista del parto.

## p\_02. ¿Ha tenido algún otro parto anterior?

### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	78	38,2	38,4	38,4
	No	125	61,3	61,6	100,0
	Total	203	99,5	100,0	
	Ns/Nc	1	,5		
Total		204	100,0		

Tabla 21: Madres que han tenido algún parto anterior, Hospital de Jarrow

### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	SÍ	1213	37,3	37,4	37,4
	No	2026	62,3	62,6	100,0
	Total	3239	99,6	100,0	
	Ns/Nc	14	,4		
Total		3253	100,0		

Tabla 22: Madres que han tenido algún parto anterior

En los dos ámbitos del estudio, la comparativa es similar mostrando que el 38,4 % de las mujeres del área de Jarrow tuvieron un parto anterior, mientras que el 61,6 % restante fueron primerizas.

A continuación, en relación a las mujeres que han indicado que éste no era su primer parto, se analiza el número de partos anteriores para las mismas:

### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1 parto	61	78,2	78,2	78,2
	2 - 3 partos	17	21,8	21,8	100,0
	Total	78	100,0	100,0	

Tabla 23: Número de partos anteriores de las madres multiparas, Hospital de Jarrow



### □ Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1 parto	1012	82,4	84,6
	2 - 3 partos	172	14,0	99,0
	>=4 partos	12	1,0	100,0
	Total	1196	97,4	100,0
Ns/Nc	32	2,6		
Total	1228	100,0		

Tabla 24: Número de partos anteriores de las madres múltiples

Las tablas de resultados muestran que, si se compara el Hospital de Jarrío con el total de los hospitales, las mujeres múltiples del área de Jarrío han tenido más partos anteriores, dado que el 21,8 % había tenido más de un parto, mientras que el 15,4 % de la totalidad de las mujeres ya había tenido al menos dos partos con anterioridad.

Es posible realizar un estudio cuantitativo para esta variable. En dicho estudio se detecta la existencia de casos en los que el número de partos resultan valores atípicos o extremos y que, por tanto, son eliminados del análisis para que éste sea lo más ajustado posible al comportamiento medio real de la variable.

### □ Resultado Hospital

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Número de partos incluido el actual	198	1	3	1,43	,607

Tabla 25: Número de partos incluido el actual, Hospital de Jarrío

### □ Resultado Global

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Número de partos incluido el actual	3153	1	3	1,40	,571

Tabla 26: Número de partos incluido el actual

Tras el análisis de esta pregunta se concluye que, en término medio, las usuarias que han dado a luz en el Hospital de Jarrío tienen 1,43 hijos, una media con una pequeña diferencia sobre el total de mujeres del Principado de Asturias (1,40).

### p\_03. ¿Cuánto pesó su criatura al nacer?

Esta cuestión no fue contestada por aquellos casos en los que el resultado del parto fue “feto muerto al nacimiento” o “nacido vivo que murió después del nacimiento”.



### □ Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1.500 - 2.399 gr.	2	1,0	1,0
	2.400 - 3.499 gr.	122	59,8	61,7
	>= 3.500 gr.	77	37,7	100,0
	<b>Total</b>	201	98,5	100,0
Ns/Nc	3	1,5		
<b>Total</b>	204	100,0		

Tabla 27: Peso de la criatura en el nacimiento, Hospital de Jarrío

### □ Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1.000 - 1.499 gr	14	,4	,4
	1.500 - 2.399 gr.	152	4,7	5,2
	2.400 - 3.499 gr.	2063	63,6	70,2
	>= 3.500 gr.	948	29,2	100,0
	<b>Total</b>	3177	98,0	100,0
Ns/Nc	65	2,0		
<b>Total</b>	3242	100,0		

Tabla 28: Peso de la criatura en el nacimiento

Sin tener en cuenta a las personas que no han contestado a esta pregunta, el porcentaje de niños o niñas nacidas en el Hospital de Jarrío con un peso que oscila entre los 2.400 y los 3.499 gramos es de 60,7 %, mientras que el de los que superan o igualan los 3.500 gramos forman el 38,3 %.

Es posible realizar un estudio cuantitativo para esta variable. En dicho estudio se detecta la existencia de casos en los pesos de las criaturas que resultan valores atípicos o extremos y que, por tanto, son eliminados del análisis para que éste sea lo más ajustado posible al comportamiento medio real de la variable.

### □ Resultado Hospital

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. tip.
¿Cuánto peso su criatura al nacer?	201	2310	4590	3361,16	448,676

Tabla 29: Peso de la criatura en el nacimiento, Hospital de Jarrío



### Resultado Global

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
¿Cuánto peso su criatura al nacer?	3116	1965	4425	3227,70	457,377

Tabla 30: Peso de la criatura en el nacimiento

El estudio cuantitativo de esta variable indica que el peso medio de las criaturas que nacieron en el Hospital de Jarrío es de 3361,16 gramos; encontrando niños/as que llegaron a un peso de 4.590 gramos. Comparativamente con los datos globales, éstos son un poco inferiores siendo el peso medio de 3.227,70 gramos

## SECCIÓN B: LA ATENCIÓN DURANTE EL EMBARAZO

### EL INICIO DEL EMBARAZO

#### p\_04. ¿Qué profesional la atendió por primera vez en su embarazo?

### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Médica/o de familia	152	74,5	74,5	74,5
	Ginecólogo/a	32	15,7	15,7	90,2
	Matrona/on	20	9,8	9,8	100,0
	Total	204	100,0	100,0	

Tabla 31: Profesional que atendió a la mujer por primera vez en su embarazo, Hospital de Jarrío

### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Médica/o de familia	1392	42,8	42,9	42,9
	Ginecólogo/a	759	23,3	23,4	66,3
	Matrona/on	1072	33,0	33,0	99,3
	Otro	24	,7	,7	100,0
	Total	3247	99,8	100,0	
Ns/Nc		6	,2		
Total		3253	100,0		

Tabla 32: Profesional que atendió a la mujer por primera vez en su embarazo

En el 74,5 % de las ocasiones fue el médico de familia quien atendió por primera vez a las usuarias de Jarrío en su embarazo, mientras que es menor en los resultados globales con el 42,9% de las veces. Sin embargo, fue el matrn/a para el 9,8 % de las mujeres de Jarrío quien atendió por primera vez a la paciente y el 33 % del total de mujeres en Asturias. En síntesis, la



mujer de este hospital fue más atendida por el médico que por el ginecólogo/a o el matrn/a en términos porcentuales, comparativamente con los datos globales.

### p\_05. Aproximadamente, ¿de cuántas semanas de gestación estaba cuando acudió por primera vez a esta consulta?

#### □ Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	<9 semanas	170	83,3	90,9
	9 semanas	5	2,5	93,6
	10 semanas	2	1,0	94,7
	11 semanas	3	1,5	96,3
	12 semanas	6	2,9	99,5
	14 - 20 semanas	1	,5	100,0
	Total	187	91,7	100,0
Ns/Nc	17	8,3		
<b>Total</b>	<b>204</b>	<b>100,0</b>		

Tabla 33: Semanas de gestación en la primera asistencia a consulta, Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	<9 semanas	2857	87,8	89,2
	9 semanas	106	3,3	92,5
	10 semanas	72	2,2	94,7
	11 semanas	18	,6	95,3
	12 semanas	110	3,4	98,8
	13 semanas	3	,1	98,8
	14 - 20 semanas	37	1,1	100,0
	Total	3203	98,5	100,0
Ns/Nc	50	1,5		
<b>Total</b>	<b>3253</b>	<b>100,0</b>		

Tabla 34: Semanas de gestación en la primera asistencia a consulta

El número de semanas de gestación transcurridas hasta que la paciente acude por primera vez a la consulta son primordiales para la detección de anomalías cromosómicas. Así, el 89,2 % de las usuarias asistieron a la primera consulta médica a las 8 primeras semanas de gestación, mientras que, con la misma prontitud el 90,9 % de las mujeres de Jarrío acuden a la consulta.

El 95,3 % de las mujeres fueron captadas en las semanas preferentes de entrada en cribado (hasta la semana 11), mientras en el Hospital de Jarrío este dato alcanza el 96,3%.



Es posible realizar un estudio cuantitativo para esta variable. En dicho estudio se detecta la existencia de casos en los que las semanas de gestación para la asistencia a la consulta resultan valores atípicos o extremos y que, por tanto, son eliminados del análisis para que éste sea lo más ajustado posible al comportamiento medio real de la variable.

#### □ Resultado Hospital

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
¿De cuántas semanas de gestación estaba cuanto acudió por primera vez a esta consulta?	180	2	11	5,21	2,008

Tabla 35: Semanas de gestación en la primera asistencia a consulta, Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
¿De cuántas semanas de gestación estaba cuanto acudió por primera vez a esta consulta?	3177	1	14	5,81	2,316

Tabla 36: Semanas de gestación en la primera asistencia a consulta

El tiempo medio de la primera consulta médica para las usuarias de Jarrío es de 5,21 semanas, resultando ser ligeramente inferior a la media global que se sitúa más cerca de la sexta semana (5,81).

### ➤ LOS CONTROLES EN EL EMBARAZO

#### p\_06. El seguimiento de su embarazo fue llevado a cabo:

##### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	En la sanidad pública	159	77,9	77,9	77,9
	En la asistencia privada	3	1,5	1,5	79,4
	En ambas	41	20,1	20,1	99,5
	No acudí a ningún programa de seguimiento	1	,5	,5	100,0
	Total	204	100,0	100,0	

Tabla 37: Seguimiento del embarazo, Hospital de Jarrío



## □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	En la sanidad pública	2289	70,4	70,6	70,6
	En la asistencia privada	45	1,4	1,4	72,0
	En ambas	905	27,8	27,9	99,9
	No acudí a ningún programa de seguimiento	2	,1	,1	100,0
	Total	3241	99,6	100,0	
Ns/Nc		12	,4		
Total		3253	100,0		

Tabla 38: Seguimiento del embarazo

Los resultados reflejan que el 70,6 % de las usuarias que conocían donde fue seguido el progreso de su embarazo, ha indicado que este tuvo lugar en la sanidad pública y si se considera únicamente a las usuarias de Jarrío este resultado es del 77,9 %.

### p\_07. ¿Cuál fue la principal razón por la que eligió ir a la asistencia privada?

Esta pregunta se encontraba dirigida a aquellas mujeres que fueron atendidas durante su embarazo en la sanidad privada, bien exclusivamente o bien de forma conjunta con la sanidad pública.

Los distintos motivos y observaciones aportados por estas mujeres para la elección de la asistencia privada durante su embarazo han sido analizados y homogeneizados para un tratamiento más igualitario de la información; siendo los más relevantes los siguientes:

1. Deseo de realización de un mayor número de controles de los que se llevan a cabo en la sanidad pública; así como deseo de tener una segunda opinión sobre el embarazo que les proporcione mayor seguridad.
2. Deseo de realización de un mayor número de ecografías durante el embarazo; así como ecografías 3D, que poder llevarse a casa.
3. Habitualmente tienen seguimiento ginecológico privado (es el ginecólogo/a de toda la vida), continuando con el mismo durante el embarazo. Esto les proporciona mayor tranquilidad.
4. Se trataba de un embarazo en circunstancias especiales (riesgo de aborto, enfermedad de la madre, fecundación in Vitro, abortos en embarazos anteriores, etc.), por lo que la asistencia privada les daba mayor seguridad.
5. Disposición de un seguro médico privado de empresa.

**p\_08. ¿Qué profesionales le atendieron durante su embarazo y cuántos controles tuvo de cada uno de ellos?**

Se trata de una pregunta de respuesta múltiple, lo que implica que cada encuestada podía señalar el número de opciones de respuesta que considerase necesario. Esto supone que la suma de los distintos porcentajes no tiene que ser 100.

**□ Resultado Hospital**

	Frecuencia	Porcentaje
Matrón/a	108	52,9%
Médico de familia	127	62,3%
Ginecólogo/a	203	99,5%
Otro profesional	1	,5%

Tabla 39: Profesionales que atendieron a las usuarias durante su embarazo, Hospital de Jarrío

**□ Resultado Global**

	Frecuencia	Porcentaje
Matrón/a	2728	83,9%
Médico de familia	617	19,0%
Ginecólogo/a	3151	96,9%
Otro profesional	122	3,7%

Tabla 40: Profesionales que atendieron a las usuarias durante su embarazo

En la atención durante el embarazo destacan, por las diferencias entre las tablas, el 62,3 % de las embarazadas en el Hospital de Jarrío que fueron atendidas por su médico, frente al 19 % del total de mujeres; y el 52,9 % de las mujeres de Jarrío frente al 83,9 % de mujeres de los datos globales, que fueron atendidas por su matrn o matrona.

A continuación se analiza el número medio de controles que cada uno de los profesionales presentados realizaron a las usuarias durante su embarazo. En este cálculo han sido eliminados los casos considerados como extremos por poder distorsionar el comportamiento normal de la variable.

Profesional	Nº Medio de Controles en los Hospitales Públicos	Nº Medio de Controles en el Hospital de Jarrío
Matrón/a	4,68	3,71
Médico de familia	1,81	3,70
Ginecólogo/a	5,3	4,70
Otros	4,71	1,00

Tabla 40.1: Controles realizados por los profesionales sanitarios las usuarias durante su embarazo





En la tabla queda patente que, en el caso del Hospital de Jarrio, es el ginecólogo/a el profesional que mayor número de controles realiza sobre las embarazadas con una media de 4,7 controles en cada embarazo.

## p\_09. Durante el embarazo, ¿la atendió siempre la misma persona?

### a. Matró/a

#### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	54	50,0	50,0	50,0
	No	54	50,0	50,0	100,0
	Total	108	100,0	100,0	

Tabla 41: Seguimiento del embarazo por parte del mismo matró/a, Hospital de Jarrio

#### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2010	73,7	73,7	73,7
	No	718	26,3	26,3	100,0
	Total	2728	100,0	100,0	

Tabla 42: Seguimiento del embarazo por parte del mismo matró/a

En esta ocasión se solicitó a las mujeres que anteriormente indicaron haber sido atendidas por el matró/a durante su embarazo, que señalaran si fueron siempre tratadas por el mismo profesional matró/a o matrona. A este respecto se observa mayor igualdad en los resultados de las respuestas de las mujeres de Jarrio, ya que el 50 % ha respondido que sí, mientras el otro 50 % ha negado que les atendiera la misma persona.

### b. Ginecólogo/a

#### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	55	27,1	27,1	27,1
	No	148	72,9	72,9	100,0
	Total	203	100,0	100,0	

Tabla 43: Seguimiento del embarazo por parte del mismo ginecólogo/a, Hospital de Jarrio

#### Resultado Global



		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	1147	36,4	36,4	36,4
	No	2002	63,5	63,6	100,0
	Total	3149	99,9	100,0	
Ns/Nc		2	,1		
Total		3151	100,0		

Tabla 44: Seguimiento del embarazo por parte del mismo ginecólogo/a

En esta ocasión también se analiza exclusivamente la opinión de las mujeres atendidas durante su embarazo por personal de ginecología.

La atención ginecológica durante el embarazo correspondió al mismo profesional en el 27,1 % de los casos en el Hospital de Jarrío; siendo un peso inferior al correspondiente con el ginecólogo/a de todas las áreas sanitarias estudiadas, llegando al 36,4 %.

#### p\_10. A su juicio, la información que le dieron los profesionales sanitarios durante su embarazo fue:

##### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy adecuada	69	33,8	34,5	34,5
	Adecuada	111	54,4	55,5	90,0
	Poco adecuada	11	5,4	5,5	95,5
	Nada adecuada	9	4,4	4,5	100,0
	Total	200	98,0	100,0	
Ns/Nc		4	2,0		
Total		204	100,0		

Tabla 45: Valoración de la información proporcionada por los profesionales sanitarios durante el embarazo, Hospital de Jarrío

##### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy adecuada	1205	37,0	37,4	37,4
	Adecuada	1692	52,0	52,5	89,8
	Poco adecuada	247	7,6	7,7	97,5
	Nada adecuada	81	2,5	2,5	100,0
	Total	3225	99,1	100,0	
Ns/Nc		28	,9		
Total		3253	100,0		

Tabla 46: Valoración de la información proporcionada por los profesionales sanitarios durante el embarazo



La información proporcionada durante el embarazo por los profesionales sanitarios del Hospital de Jarrío (sin especificar ninguna tipología) ha sido valorada de un modo positivo por el 90 % de las mujeres; calificándola el 55,5 % como “adecuada” y el 34,5 % como “muy adecuada”. Estos datos reflejan unos porcentajes similares con respecto a los datos globales.

## ➤ PRUEBAS PRENATALES

### p\_11. Durante el embarazo, ¿le hicieron alguna de las siguientes pruebas para saber si el feto padecía defectos o malformaciones congénitas?

Se trata de una pregunta de respuesta múltiple, lo que implica que cada encuestada podía señalar el número de opciones de respuesta que considerase necesario. Esto supone que la suma de los distintos porcentajes no tiene que ser 100.

#### ❑ Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje
Ecografías de alta resolución en la semana 12	146	71,6%
Amniocentesis (pinchazo en el vientre)	32	15,7%
Cribado combinado. Análisis de la sangre en la semana 9-10	165	80,9%
No le hicieron ninguna prueba	6	2,9%
No sabe o no se acuerda	7	3,4%

Tabla 47: Realización de pruebas para conocer si el feto padecía de algún tipo de malformaciones congénitas, Hospital de Jarrío

#### ❑ Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje
Ecografías de alta resolución en la semana 12	2045	62,9%
Amniocentesis (pinchazo en el vientre)	474	14,6%
Cribado combinado. Análisis de sangre en la semana 9-10	2515	77,3%
No le hicieron ninguna prueba	259	8,0%
No sabe o no se acuerda	88	2,7%

Tabla 48: Realización de pruebas para conocer si el feto padecía de algún tipo de malformaciones congénitas

La analítica del primer trimestre es la prueba más habitual entre las embarazadas para conocer si el feto padecía defectos o malformaciones congénitas, tanto en el Hospital de Jarrío (80,9 %) como en el resultado completo de hospitales (77,3 %).

Se detecta que el porcentaje de los que ha señalado que no se llevó a cabo ningún tipo de prueba para conocer si el feto padecía algún tipo de malformación congénita es mayor en el conjunto de la población asturiana que en el Hospital de Jarrío, siendo 8 % y 2,9 % sus porcentajes correspondientes.



## p\_12. ¿Le pidieron consentimiento para hacerlas?

Esta pregunta se encontraba dirigida a las mujeres sometidas a algún tipo de prueba médica para conocer si el feto padecía defectos o malformaciones congénitas.

### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	147	77,0	86,0	86,0
	No	24	12,6	14,0	100,0
	Total	171	89,5	100,0	
Ns/No recuerda		20	10,5		
Total		191	100,0		

Tabla 49: Solicitud de consentimiento para la realización de las pruebas médicas, Hospital de Jarrow

### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2391	82,3	89,8	89,8
	No	273	9,4	10,2	100,0
	Total	2664	91,7	100,0	
Ns/No recuerda		242	8,3		
Total		2906	100,0		

Tabla 50: Solicitud de consentimiento para la realización de las pruebas médicas

De entre aquellas mujeres que en la anterior de las cuestiones afirmaron haberse sometido a algún tipo de prueba médica para conocer si el feto padecía algún tipo de defecto o malformación congénita, destaca que el porcentaje de mujeres a las que les fue solicitado su consentimiento para realizar dicha prueba es mayor en los datos totales que en los datos parciales del Hospital de Jarrow (el 89,8 % frente al 86 % respectivamente).

## p\_13. ¿Le dieron información suficiente y tuvo tiempo para tomar la decisión de hacerlas o no?

Esta pregunta se encontraba dirigida a las mujeres sometidas a algún tipo de prueba médica para conocer si el feto padecía defectos o malformaciones congénitas.



#### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	151	79,1	87,8	87,8
	No	21	11,0	12,2	100,0
	Total	172	90,1	100,0	
Ns/No recuerda		19	9,9		
Total		191	100,0		

Tabla 51: Valoración de la información y tiempo sobre las pruebas médicas, Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2425	83,5	89,8	89,8
	No	275	9,5	10,2	100,0
	Total	2700	92,9	100,0	
Ns/No recuerda		206	7,1		
Total		2906	100,0		

Tabla 52: Valoración de la información y tiempo sobre las pruebas médicas

Se observa en la tabla de resultados que existe una percepción general positiva en relación a la información proporcionada sobre las pruebas a realizar y el tiempo proporcionado para tomar la decisión de llevarlas a cabo en el Hospital de Jarrío, puesto que el 87,8 % de las mujeres que sí han contestado a esta pregunta, han respondido positivamente. Comparativamente no se aprecian diferencias significativas con los resultados globales de Asturias.

#### p\_14. ¿Por qué razón no le hicieron pruebas para saber si el feto padecía alguna alteración?

Esta cuestión solamente fue contestada por aquellas mujeres a las que no les fueron realizadas ningún tipo de pruebas médicas para conocer si el feto padecía algún tipo de alteración.



### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No me las propusieron	3	50,0	75,0	75,0
	Estaba fuera de plazo para hacerlas	1	16,7	25,0	100,0
	Total	4	66,7	100,0	
Ns/No lo recuerda		2	33,3		
Total		6	100,0		

Tabla 53: Motivos por los que no fueron realizadas las pruebas médicas para conocer si el feto padecía malformaciones, Hospital de Jarrío

### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No me las propusieron	140	53,8	67,2	67,2
	No quiso hacerlas	26	10,0	12,4	79,6
	Estaba fuera de plazo para hacerlas	23	8,9	11,1	90,7
	Otras	19	7,4	9,3	100,0
	Total	208	80,2	100,0	
Ns/No lo recuerda		51	19,8		
Total		259	100,0		

Tabla 54: Motivos por los que no fueron realizadas las pruebas médicas para conocer si el feto padecía malformaciones

Tal y como muestra la tabla, el 75 % de las usuarias de Jarrío y el 67,2 % de las mujeres globales no se hicieron estas pruebas médicas porque no se las propusieron.

## p\_15. Aproximadamente, ¿cuántas ecografías le hicieron en total durante su embarazo?

### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	< 3 ecografías	5	2,5	2,5	2,5
	3 ecografías	79	38,7	40,1	42,6
	4 ecografías	55	27,0	27,9	70,6
	5 - 6 ecografías	39	19,1	19,8	90,4
	> 6 ecografías	19	9,3	9,6	100,0
	Total	197	96,6	100,0	
Ns/No lo recuerda		7	3,4		
Total		204	100,0		

Tabla 55: Ecografías realizadas durante el embarazo, Hospital de Jarrío



### Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	< 3 ecografías	99	3,0	3,1
	3 ecografías	1017	31,3	34,7
	4 ecografías	853	26,2	61,3
	5 - 6 ecografías	737	22,6	84,2
	> 6 ecografías	507	15,6	100,0
	Total	3211	98,7	100,0
Ns/No lo recuerda	42	1,3		
<b>Total</b>	<b>3253</b>	<b>100,0</b>		

Tabla 56: Ecografías realizadas durante el embarazo

El número de ecografías que las usuarias han indicado que les realizaron durante su embarazo ha sido categorizado tal y como se observa en las tablas. De las mismas se diferencia el 31,7 % de las mujeres totales, las cuales señalan que en su caso se llevaron a cabo 3 ecografías; mientras, el porcentaje de las que realizaron 3 ecografías en el Hospital de Jarrío es de 40,1 %.

Es posible realizar un estudio cuantitativo para esta variable. En dicho estudio se detecta la existencia de casos en los que el número de ecografías resultan valores atípicos o extremos y que, por tanto, son eliminados del análisis para que éste sea lo más ajustado posible al comportamiento medio real de la variable.

### Resultado Hospital

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
¿Cuántas ecografías le hicieron en total, durante su embarazo?	189	2	8	3,99	1,259

Tabla 57: Ecografías realizadas durante el embarazo, Hospital de Jarrío

### Resultado Global

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
¿Cuántas ecografías le hicieron en total, durante su embarazo?	3152	1	10	4,54	1,844

Tabla 58: Ecografías realizadas durante el embarazo

En la representación gráfica de la variables se observa como el número medio de los datos globales es de 4,54 ecografías; superior por tanto a los resultados recogidos de las embarazadas en Jarrío que no superan las 4 ecografías por término medio (3,99).

**p\_16. Durante su embarazo, ¿acudió a clases de preparación al parto en la sanidad pública?****Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	141	69,1	69,1	69,1
	No	63	30,9	30,9	100,0
	Total	204	100,0	100,0	

Tabla 59: Asistencia a clases de preparación al parto, Hospital de Jarrío

**Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2094	64,4	64,6	64,6
	No	1150	35,3	35,4	100,0
	Total	3244	99,7	100,0	
Ns/Nc		9	,3		
Total		3253	100,0		

Tabla 60: Asistencia a clases de preparación al parto

El 64,6 % de las mujeres han señalado que durante su embarazo sí acudieron a clases de preparación al parto en la sanidad pública, mientras que, un porcentaje superior, el 69,1 % de las usuarias de Jarrío afirma lo mismo.

El 35,3 % de todas y el 30,9 % de las restantes de Jarrío indica que en su caso, no se acudió a estas clases, siendo los motivos principales de no asistencia los que se exponen a continuación.

**Motivo por el que no se acudió a las clases de preparación al parto.**

Cuestión respondida solamente por las usuarias que no asistieron a clases de preparación al parto.

Los resultados de esta pregunta son los siguientes.

**Resultado Hospital**





		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No lo consideré necesario	23	36,5	36,5	36,5
	No me informaron de esas clases	6	9,5	9,5	46,0
	No, porque asistí a clases prenatales privadas	3	4,8	4,8	50,8
	No he asistido por problemas de horarios	31	49,2	49,2	100,0
	Total	63	100,0	100,0	

Tabla 61: Motivos de no asistencia a clases de preparación al parto, Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No lo consideré necesario	567	49,3	49,8	49,8
	No me informaron de esas clases	120	10,4	10,5	60,3
	No había plazas libres	9	,8	,8	61,1
	No, porque asistí a clases prenatales privadas	45	3,9	3,9	65,0
	No he asistido por problemas de horarios	399	34,7	35,0	100,0
	Total	1139	99,1	100,0	
	Ns/Nc	10	,9		
Total		1150	100,0		

Tabla 62: Motivos de no asistencia a clases de preparación al parto

Destaca que exista un porcentaje superior de mujeres de Asturias (49,8 % frente al 36,5 %) que no fueron a clases pre -parto porque no consideró que esta asistencia fuera necesaria, respecto a las mujeres consideradas sólo en el área de Jarrío.

Los problemas con los horarios de las clases se convierten en otro de los motivos más argumentados por las mujeres que no asistieron a clases de preparación al parto en la sanidad pública, pero esta vez en mayor medida que los datos globales puesto que alcanzan el 49,2 % de las mujeres pertenecientes a Jarrío.

### p\_17. Si asistió a las clases...

Todas aquellas mujeres que no asistieron a clases de preparación al parto no respondieron a estas preguntas.

#### a. Valore la utilidad que le proporcionaron para el parto y el postparto

##### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy útiles	58	41,1	41,1	41,1
	Útiles	53	37,6	37,6	78,7
	Relativamente útiles	19	13,5	13,5	92,2
	Poco útiles	3	2,1	2,1	94,3
	Nada útiles	8	5,7	5,7	100,0
	Total	141	100,0	100,0	

Tabla 63: Valoración de la utilidad de las clases de preparación al parto, Hospital de Jarrow

##### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy útiles	851	40,6	40,8	40,8
	Útiles	801	38,2	38,4	79,2
	Relativamente útiles	115	5,5	5,5	84,8
	Poco útiles	182	8,7	8,7	93,5
	Nada útiles	136	6,5	6,5	100,0
	Total	2085	99,6	100,0	
Ns/Nc		9	,4		
Total		2094	100,0		

Tabla 64: Valoración de la utilidad de las clases de preparación al parto

Se observa en la primera tabla, en comparación con los resultados globales, que para el 78,7 % de las mujeres que asistieron a clases de preparación al parto éstas fueron “útiles” (37,6 %) o “muy útiles” (41,1 %), es decir, el porcentaje de satisfacción alcanza en ambas áreas proporciones elevadas. Sin embargo, resultaron “poco” o “nada útiles” para el 7,8 % de las mujeres embarazadas en el Hospital de Jarrow.

## b. ¿Tuvo la oportunidad de elegir el horario de asistencia a las clases?

## □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	27	19,1	19,1	19,1
	No	114	80,9	80,9	100,0
	Total	141	100,0	100,0	

Tabla 65: Posibilidad de elección del horario de asistencia a las clases, Hospital de Jarrío

## □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	730	34,9	35,1	35,1
	No	1352	64,6	64,9	100,0
	Total	2082	99,4	100,0	
Ns/Nc		12	,6		
Total		2094	100,0		

Tabla 66: Posibilidad de elección del horario de asistencia a las clases

El 64,9 % de las madres que asistió a clases de preparación para el parto en la sanidad pública ha indicado que no tuvo la oportunidad de elegir el horario, mientras que para la misma pregunta, el porcentaje de mujeres en el Hospital de Jarrío es del 80,9 %.

## c. Valore la adecuación del horario

## □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy adecuado	14	9,9	10,0	10,0
	Adecuado	94	66,7	67,1	77,1
	Relativamente adecuado	16	11,3	11,4	88,6
	Poco adecuado	12	8,5	8,6	97,1
	Nada adecuado	4	2,8	2,9	100,0
	Total	140	99,3	100,0	
Ns/Nc		1	,7		
Total		141	100,0		

Tabla 67: Valoración del horario de asistencia a las clases, Hospital de Jarrío



#### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Muy adecuado	340	16,2	16,3	16,3
	Adecuado	1158	55,3	55,6	72,0
	Relativamente adecuado	138	6,6	6,6	78,6
	Poco adecuado	298	14,2	14,3	92,9
	Nada adecuado	147	7,0	7,1	100,0
Total		2081	99,4	100,0	
Ns/Nc		12	,6		
Total		2094	100,0		

Tabla 68: Valoración del horario de asistencia a las clases

En relación al horario de las clases de preparación al parto del Hospital de Jarrío, la comparativa con los datos globales, vuelve a tener un nivel de satisfacción elevado con un 77,1 % que valora su adecuación de un modo positivo (67,1 % como adecuado y 10 % como muy adecuado). Manifiesta su postura contraria a dicho horario el 11,4 % de las mujeres; ya que lo califican en su caso como poco o nada adecuado (8,6 % y 2,9 % respectivamente).

#### d. ¿Estaba permitida la asistencia de su pareja o alguien de su elección?

##### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	126	89,4	89,4	89,4
	No	15	10,6	10,6	100,0
	Total	141	100,0	100,0	

Tabla 69: Posibilidad de llevar un acompañante a las clases de preparación al parto, Hospital de Jarrío

##### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	1234	58,9	67,3	67,3
	No	601	28,7	32,7	100,0
	Total	1834	87,6	100,0	
Ns/Nc		260	12,4		
Total		2094	100,0		

Tabla 70: Posibilidad de llevar un acompañante a las clases de preparación al parto

Es destacable que, en el caso del Hospital de Jarrío, no exista ninguna mujer que desconociera si estaba o no permitida la asistencia de un acompañante a sus clases de preparación al parto. Por otro lado, el 89,4 % confirma la posibilidad de acudir en compañía de

otra persona siendo el 67,3 % el peso correspondiente a la totalidad de mujeres que han respondido de la misma forma.

### SECCIÓN C: EL PARTO Y NACIMIENTO DE LA CRIATURA

Las preguntas contempladas en este epígrafe se encuentran dirigidas a todas las mujeres excepto a aquellas que parieron por cesárea programada.

#### p\_18. ¿Cómo empezó el proceso del parto?

##### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	De manera natural	150	79,8	82,4	82,4
	Fue inducido o provocado	32	17,0	17,6	100,0
	Total	182	96,8	100,0	
Ns/Nc		6	3,2		
Total		188	100,0		

Tabla 71: Inicio del proceso de parto, Hospital de Jarrío

##### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	De manera natural	2171	72,3	75,9	75,9
	Fue inducido o provocado	689	22,9	24,1	100,0
	Total	2861	95,2	100,0	
Ns/Nc		144	4,8		
Total		3004	100,0		

Tabla 72: Inicio del proceso de parto

El proceso de parto comenzó de forma natural en el 75,9 % de las ocasiones; mientras que entre las mujeres del Hospital de Jarrío comenzó en el 82,4 % de los casos. En consecuencia, los partos inducidos o provocados son mayores, en términos porcentuales, en el área sanitaria de Asturias que en Jarrío.

#### p\_19. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo duró su último proceso de parto?

##### Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	3 - 6 h.	26	13,8	13,8
	7 - 12 h.	120	63,8	77,7
	>12 h	42	22,3	100,0
	Total	188	100,0	100,0

Tabla 73: Duración del último proceso de parto, Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	3 - 6 h.	313	10,4	10,5
	7 - 12 h.	1967	65,5	76,2
	>12 h	710	23,6	100,0
	Total	2991	99,6	100,0
Ns/Nc	13	,4		
Total	3004	100,0		

Tabla 74: Duración del último proceso de parto

El tiempo de duración del proceso de parto (que pudo ser expresado tanto en horas como en minutos) ha sido codificado de acuerdo a los tramos de frecuencias que se muestran en la tabla. En dicha tabla se observa que en el 63,8 % de las ocasiones en el Hospital de Jarrío, la duración de este proceso fue de 7 a 12 horas; siendo ligeramente inferior que el total de los casos.

Es posible realizar un estudio cuantitativo para esta variable. En dicho estudio se detecta la existencia de casos en los que los tiempos de duración del parto resultan valores atípicos o extremos y que, por tanto, son eliminados del análisis para que éste sea lo más ajustado posible al comportamiento medio real de la variable.

#### □ Resultado Hospital

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Horas que duró su último proceso de parto	170	3	19	9,54	3,421

Tabla 75: Duración del último proceso de parto, Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Horas que duró su último proceso de parto	2793	3	18	10,21	3,164

Tabla 76: Duración del último proceso de parto



En los distintos hospitales de Asturias el tiempo medio para el proceso de parto es de 10,21 horas, mientras que en el Hospital de Jarrío el tiempo medio es de 9,54 horas.

### p\_20. ¿Sabe Vd. si se le aplicó alguna de las siguientes técnicas?

Se trata de una pregunta de respuesta múltiple, lo que implica que cada encuestada podía señalar el número de opciones de respuesta que considerase necesario. Esto supone que la suma de los distintos porcentajes no tiene que ser 100.

#### □ Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje
Le dieron un gel vaginal	25	13,3%
Le rompieron la bolsa de las aguas	67	35,6%
Le pusieron un gotero con oxitocina	100	53,2%
No se le aplicaron ninguna de las anteriores	18	9,6%
No sabe o no contesta	4	2,1%

Tabla 77: Aplicación de distintas técnicas durante el proceso de parto, Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

	Frecuencias	Porcentaje
Le dieron un gel vaginal	371	12,3%
Le rompieron la bolsa de las aguas	1396	46,5%
Le pusieron un gotero con oxitocina	1717	57,2%
No se le aplicaron ninguna de las anteriores	508	16,9%
No sabe o no contesta	59	2,0%

Tabla 78: Aplicación de distintas técnicas durante el proceso de parto

El porcentaje de mujeres, a las cuales, no les aplicaron ninguna de las técnicas planteadas es menor en el Hospital de Jarrío que en los datos globales, siendo del 9,6 % y del 16,9 % respectivamente. También es menor la rotura de la bolsa de las aguas en este hospital que en el resultado global (35,6 % frente al 46,5 % de la totalidad de las mujeres).

Entre las distintas técnicas planteadas a las usuarias, destaca por ser la que con mayor diferencia se presenta, la práctica de la ruptura de la bolsa de aguas, llevada a cabo para el 46,5 % de las mujeres totales y el 35,6 % de las mujeres de Jarrío.

### p\_21. Durante el proceso de dilatación anterior al parto, ¿pudo moverse y elegir la posición que le resultaba más cómoda?

#### □ Resultado Hospital



		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, la mayor parte del tiempo	157	83,5	88,7	88,7
	Sí, durante algún tiempo	15	8,0	8,5	97,2
	No, tuve que estar en reposo	5	2,7	2,8	100,0
	Total	177	94,1	100,0	
Ns/Nc		11	5,9		
Total		188	100,0		

Tabla 79: Posibilidad de movimiento y elección de la posición más cómoda, Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, la mayor parte del tiempo	1983	66,0	70,3	70,3
	Sí, durante algún tiempo	248	8,3	8,8	79,0
	No, tuve que estar en reposo	592	19,7	21,0	100,0
	Total	2822	93,9	100,0	
Ns/Nc		182	6,1		
Total		3004	100,0		

Tabla 80: Posibilidad de movimiento y elección de la posición más cómoda

Como queda reflejado en las tablas, el porcentaje de las mujeres que no han contestado a esta cuestión es similar en ambos resultados. De entre las que sí lo han hecho, existe una mayor proporción de mujeres en Jarrío que durante el proceso de dilatación anterior al parto sí pudo moverse y elegir aquella posición que le resultaba más cómoda. Los porcentajes son del 88,7 % en el área de Jarrío y el 70,3 % en los distintos hospitales públicos de Asturias.

#### p\_22. ¿Le permitieron beber o comer durante el proceso de dilatación anterior al parto?

##### □ Resultado Hospital





		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, beber y comer	55	29,3	32,7	32,7
	Sólo beber pero no comer	53	28,2	31,5	64,3
	Ni beber ni comer	60	31,9	35,7	100,0
	Total	168	89,4	100,0	
Ns/Nc		20	10,6		
Total		188	100,0		

Tabla 81: Posibilidad de comer y beber durante el proceso de dilatación anterior al parto, Hospital de Jarrío

 Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, beber y comer	216	7,2	7,9	7,9
	Sólo beber pero no comer	202	6,7	7,4	15,3
	Ni beber ni comer	2305	76,7	84,7	100,0
	Total	2723	90,6	100,0	
Ns/Nc		281	9,4		
Total		3004	100,0		

Tabla 82: Posibilidad de comer y beber durante el proceso de dilatación anterior al parto

En estrecha relación con la pregunta anterior, en esta ocasión se demandó a las mujeres que indicasen si en este proceso de dilatación tuvieron permiso para beber y/o comer. En este caso se observa una clara diferencia de entre las que sí lo hicieron, dependiendo del lugar donde se encontraran. Así, el 64,3 % de las mujeres de Jarrío tuvieron la posibilidad de tomar alguna bebida (de éstos, el 32,7 % pudo beber y comer, y el 31,5 % sólo beber), mientras que para el total de mujeres embarazadas el resultado se reduce hasta el 15,3 %.

**p\_23. Durante el proceso del parto, incluido el expulsivo, ¿cree que le proporcionaron el alivio del dolor adecuado?**



### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, totalmente	122	64,9	70,1	70,1
	Solo en determinados momentos	21	11,2	12,1	82,2
	No, porque no fue posible	31	16,5	17,8	100,0
	Total	174	92,6	100,0	
Ns/No lo recuerda		14	7,4		
Total		188	100,0		

Tabla 83: Valoración del alivio del dolor proporcionado durante el proceso de parto, Hospital de Jarrío

### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, totalmente	1898	63,2	68,2	68,2
	Solo en determinados momentos	398	13,2	14,3	82,5
	No, porque no fue posible	488	16,3	17,5	100,0
	Total	2783	92,7	100,0	
Ns/No lo recuerda		221	7,3		
Total		3004	100,0		

Tabla 84: Valoración del alivio del dolor proporcionado durante el proceso de parto

En la tabla de resultados queda patente que el 68,2 % de las madres que dieron a luz en la sanidad pública considera que durante el proceso de parto les fue proporcionado de forma completa el alivio del dolor adecuado; siendo el 70,1 % de las mujeres exclusivamente de Jarrío.

### p\_24. Durante el proceso del parto, incluido el expulsivo, ¿utilizó o le aplicaron alguna de las siguientes técnicas para aliviar el dolor?

Esta cuestión se contempla exclusivamente para las madres que han dado a luz a su bebé mediante parto vaginal.

Se trata de una pregunta de respuesta múltiple, cada encuestada podía señalar el número de opciones de respuesta que considerase necesario. Esto implica que la suma de los distintos porcentajes no tiene que ser 100.

### Resultado Hospital



	Frecuencias	Porcentaje
Métodos naturales (p.e. respiración, masajes)	113	66,5%
Duchas o baño de agua caliente	23	13,5%
Gas y aire a través de una mascarilla	8	4,7%
Analgésicos o calmantes del dolor	1	,6%
Analgesia epidural o similar	94	55,3%
Otras técnicas	13	7,6%
No utilizó ni le aplicaron nada para aliviar el dolor	22	12,9%

Tabla 85: Aplicación de técnicas para aliviar el dolor durante el proceso de parto, Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

	Frecuencias	Porcentaje
Métodos naturales (p.e. respiración, masajes)	886	33,8%
Duchas o baño de agua caliente	123	4,7%
Gas y aire a través de una mascarilla	96	3,7%
Analgésicos o calmantes del dolor	179	6,8%
Analgesia epidural o similar	2026	77,3%
Otras técnicas	69	2,6%
No utilizó ni le aplicaron nada para aliviar el dolor	251	9,6%

Tabla 86: Aplicación de técnicas para aliviar el dolor durante el proceso de parto

De entre el conjunto de técnicas presentadas para aliviar el dolor durante el proceso de parto, aquella que se utilizó en más ocasiones en el Hospital de Jarrío son los métodos naturales (66,5 %) en vez de utilizar la analgesia epidural o similar (55,3 %), la cual es la que más se empleo en los hospitales públicos alcanzando el 77,3 % de los embarazos.

El 12,9 % de las mujeres de Jarrío ha indicado que en su caso no se utilizó ninguna técnica para aliviar el dolor del parto.

Respecto a las mujeres que han señalado que en su caso se aplicaron otro tipo de técnicas se repite con mayor frecuencia la siguiente:

- Pelota o balón de psicomotricidad

#### p\_25. ¿Le ofrecieron analgesia epidural?

Únicamente se formula esta pregunta a las mujeres que han dado a luz mediante parto vaginal.



## Hospital de Jarrío

❑ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	139	81,8	84,8	84,8
	No	25	14,7	15,2	100,0
	Total	164	96,5	100,0	
Ns/Nc		6	3,5		
Total		170	100,0		

Tabla 87: Oferta de analgesia epidural, Hospital de Jarrío

❑ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2218	84,6	86,1	86,1
	No	357	13,6	13,9	100,0
	Total	2575	98,2	100,0	
Ns/Nc		47	1,8		
Total		2622	100,0		

Tabla 88: Oferta de analgesia epidural

La analgesia epidural es una de las técnicas médicas de alivio del dolor del proceso de parto más conocidas. En el Hospital de Jarrío, el 84,8 % de las embarazadas ha indicado que en su proceso de parto sí se les ofreció dicha analgesia; siendo ligeramente inferior a las 86,1 % de las mujeres de las distintas clínicas públicas donde dieron a luz.

Como complemento a la oferta de la analgesia epidural es de interés conocer si a aquellas mujeres a las que les fue ofrecida, la aceptaron o no.

❑ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	90	64,7	64,7	64,7
	No	49	35,3	35,3	100,0
	Total	139	100,0	100,0	

Tabla 89: Aceptación de analgesia epidural, Hospital de Jarrío

❑ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	1964	88,5	88,5	88,5
	No	254	11,5	11,5	100,0
	Total	2218	100,0	100,0	

Tabla 90: Aceptación de analgesia epidural



El 88,5 % de la totalidad de las mujeres aceptaron la analgesia epidural que les fue ofrecida como método de alivio del dolor durante su proceso de parto, mientras en Jarrío, la aceptación de esta propuesta fue del 64,7 %.

## ➤ EL NACIMIENTO DEL BEBÉ

Las preguntas contempladas en este bloque (p\_26 a p\_29) se encuentran dirigidas a todas las mujeres excepto a aquellas que parieron por cesárea.

### p\_26. ¿En qué posición dio a luz a su bebé?

#### ❑ Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Tumbada con las piernas apoyadas en los estribos	51	30,0	30,5
	Sentada/ sentada apoyada en almohadas	25	14,7	45,5
	De pie, en cuclillas o de rodillas	2	1,2	46,7
	Otro	89	52,4	100,0
	Total	167	98,2	100,0
Ns/Nc	3	1,8		
<b>Total</b>	<b>170</b>	<b>100,0</b>		

Tabla 91: Posición en la que se dio a luz a la criatura, Hospital de Jarrío

#### ❑ Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Tumbada con las piernas apoyadas en los estribos	2188	83,4	83,9
	Sentada/ sentada apoyada en almohadas	307	11,7	95,6
	De costado	13	,5	96,1
	De pie, en cuclillas o de rodillas	28	1,1	97,2
	Otro	73	2,8	100,0
	Total	2609	99,5	100,0
Ns/Nc	14	,5		
<b>Total</b>	<b>2622</b>	<b>100,0</b>		

Tabla 92: Posición en la que se dio a luz a la criatura



En este caso, en el Hospital de Jarrío, la posición más habitual en la que se dio a luz al niño o niña fue tumbada con las piernas apoyadas en los estribos, 30,5 %. Con mucha diferencia de lo indicado por el resto de embarazadas en Asturias, debido a que en Jarrío se utilizaron otras posiciones distintas de las indicadas para dar a luz.

Entre el 53,3 % de las mujeres que dio a luz en una posición distinta de las planteadas en el cuestionario se encuentran con más frecuencia:

- Semitumbada en una silla de parto
- Semitumbada y en cuclillas

### p\_27. ¿Le afeitaron o rasuraron el periné?

#### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	19	11,2	11,7	11,7
	No	144	84,7	88,3	100,0
	Total	163	95,9	100,0	
Ns/No lo recuerda		7	4,1		
Total		170	100,0		

Tabla 93: Mujeres a las que afeitaron o rasuraron el periné, Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	963	36,7	37,5	37,5
	No	1602	61,1	62,5	100,0
	Total	2566	97,8	100,0	
Ns/No lo recuerda		57	2,2		
Total		2622	100,0		

Tabla 94: Mujeres a las que afeitaron o rasuraron el periné

Durante el proceso de parto vaginal en el Hospital de Jarrío, el 11,7 % de las mujeres indicó que les fue rasurado o afeitado el periné; por debajo del 37,5 % del total de mujeres en los hospitales públicos.

### p\_28. ¿Le aplicaron un enema o lavativa?



### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	10	5,9	6,5	6,5
	No	144	84,7	93,5	100,0
	Total	154	90,6	100,0	
Ns/No lo recuerda		16	9,4		
Total		170	100,0		

Tabla 95: Mujeres a las que aplicaron un enema o lavativa, Hospital de Jarrow

### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	952	36,3	37,9	37,9
	No	1558	59,4	62,1	100,0
	Total	2511	95,7	100,0	
Ns/No lo recuerda		112	4,3		
Total		2622	100,0		

Tabla 96: Mujeres a las que aplicaron un enema o lavativa

El enema o lavativa es otra de las técnicas o procedimientos más habituales durante el proceso de parto. El 4,3 % de las mujeres ha manifestado que no recuerda si durante su proceso de parto les fue aplicado un enema o lavativa, mientras que este porcentaje asciende al 9,3 % si se considera únicamente la respuesta de las mujeres de Jarrow.

Siguiendo con este estudio parcial, de entre las mujeres que sí han contestado, sólo al 6,5 % le aplicaron un enema o lavativa; frente al 37,9 % del peso de las mujeres que recibieron esta técnica en los hospitales estatales.

## p\_29. En el expulsivo, ¿se le practicó una episiotomía?

### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	14	8,2	8,5	8,5
	No	151	88,8	91,5	100,0
	Total	165	97,1	100,0	
Ns/No lo recuerda		5	2,9		
Total		170	100,0		

Tabla 97: Mujeres a las que les fue aplicada una episiotomía, Hospital de Jarrow



### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	1769	67,5	69,4	69,4
	No	781	29,8	30,6	100,0
	Total	2550	97,2	100,0	
Ns/No lo recuerda		72	2,8		
Total		2622	100,0		

Tabla 98: Mujeres a las que les fue aplicada una episiotomía

En esta última cuestión del apartado, se solicitó a las mujeres cuyo parto fue vaginal que señalaran si se les practicó una episiotomía o corte en la entrada de la vulva para facilitar la expulsión.

Se observa en la tabla de resultados para el Hospital de Jarrío que el 8,5 % de las mujeres ha confirmado la realización de la misma, siendo inferior al 69,4 % del total de mujeres embarazadas en los distintos hospitales del Principado de Asturias.

### ➤ EL PERSONAL QUE LA ATENDIÓ

**p\_30. ¿Le atendió la misma matrona o matrn durante el proceso de parto y nacimiento?**

### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	160	78,4	78,8	78,8
	No, hubo más	43	21,1	21,2	100,0
	Total	203	99,5	100,0	
Ns/Nc		1	,5		
Total		204	100,0		

Tabla 99: Atención por parte de la misma matrona/matrn durante todo el proceso de parto, Hospital de Jarrío

### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	1673	51,4	51,7	51,7
	No, hubo más	1561	48,0	48,3	100,0
	Total	3234	99,4	100,0	
Ns/Nc		19	,6		
Total		3253	100,0		

Tabla 100: Atención por parte de la misma matrona/matrn durante todo el proceso de parto





La primera de las cuestiones relativas al personal que atendió a las embarazadas durante el proceso de parto y nacimiento analiza si en este tiempo se recibió atención del mismo matrn o matrona o si, por el contrario, fueron varios los profesionales que la atendieron. Así, queda patente que en el Hospital de Jarrío es más frecuente que le atienda el mismo matrn o matrona reafirmado por el 78,8 % de los casos, mientras el 51,7 % del total de mujeres ha indicado que en su caso la atención también fue proporcionada por el mismo matrn/a.

### p\_31. ¿Conocía al personal sanitario que la atendió en el proceso de parto y nacimiento antes de iniciarse éste?

#### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Solo al ginecólogo/a	26	12,7	12,9	12,9
	Solo a la matrona/on	57	27,9	28,2	41,1
	A ambos	49	24,0	24,3	65,3
	A ninguno/a	70	34,3	34,7	100,0
	Total	202	99,0	100,0	
	Ns/Nc	2	1,0		
Total		204	100,0		

Tabla 101: Conocimiento del personal sanitario de la atención en el parto, Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Solo al ginecólogo/a	395	12,1	12,2	12,2
	Solo a la matrona/on	275	8,5	8,5	20,7
	A ambos	335	10,3	10,3	31,0
	A ninguno/a	2232	68,6	69,0	100,0
	Total	3237	99,5	100,0	
	Ns/Nc	16	,5		
Total		3253	100,0		

Tabla 102: Conocimiento del personal sanitario de la atención en el parto

El conocimiento previo del personal sanitario, tanto médico como matrn/a, que atendió a las usuarias durante su proceso de parto y nacimiento se configura como la siguiente de las cuestiones analizadas en esta sección.

Las respuestas al respecto indican que, si se analizan exclusivamente las respuestas de las usuarias de Jarrío, conocían en mayor medida a los profesionales que la atendieron que las usuarias del total de hospitales estudiados, dado que el 34,7 % de las primeras y el 69 % de las segundas no conocían a ninguno de los profesionales con anterioridad.



Además, existe un mayor número de personas en Jarrío que conocen a su matrona/ón (28,2 %) que al ginecólogo/a (12,9 %).

### p\_32. Señale el grado de confianza que le inspiró el personal que le atendió durante el proceso de parto y nacimiento

#### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mucha	160	78,4	78,8	78,8
	Bastante	37	18,1	18,2	97,0
	Alguna	5	2,5	2,5	99,5
	Poca	1	,5	,5	100,0
	Total	203	99,5	100,0	
	Ns/Nc	1	,5		
Total		204	100,0		

Tabla 103: Grado de confianza inspirado por el personal que le atendió durante el parto y nacimiento, Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Mucha	1878	57,7	58,3	58,3
	Bastante	945	29,0	29,3	87,6
	Alguna	172	5,3	5,3	93,0
	Poca	147	4,5	4,6	97,5
	Ninguna	80	2,5	2,5	100,0
	Total	3222	99,1	100,0	
	Ns/Nc	31	,9		
Total		3253	100,0		

Tabla 104: Grado de confianza inspirado por el personal que le atendió durante el parto y nacimiento

La confianza inspirada por el personal del que se recibió atención durante el proceso de parto y nacimiento ha sido valorada de un modo más positivo en Jarrío por el 97 % (18,2 % ha señalado “bastante” y 78,8 % ha indicado “mucha”) que en los resultados globales donde esta cifra se queda en el 87,6 %. Estos datos dan una idea de la satisfacción generalizada que tienen las usuarias en relación a este aspecto.

**p\_33. ¿Estaba presente el/la ginecóloga/obstetra en el momento del nacimiento?**

Esta pregunta va a ser analizada solamente para los partos vaginales.

 **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	76	44,7	46,6	46,6
	No	87	51,2	53,4	100,0
	Total	163	95,9	100,0	
No se acuerda		7	4,1		
Total		170	100,0		

Tabla 105: Presencia del ginecólogo/obstetra en el momento del nacimiento, Hospital de Jarrío

 **Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	1433	54,6	58,5	58,5
	No	1018	38,8	41,5	100,0
	Total	2451	93,5	100,0	
No se acuerda		172	6,5		
Total		2622	100,0		

Tabla 106: Presencia del ginecólogo/obstetra en el momento del nacimiento

A este respecto, del total de partos vaginales, destaca que el 6,5 % y el 4,1 % de las usuarias en el conjunto de hospitales y en Jarrío respectivamente, no se acuerda de si su ginecólogo/a estuvo presente en el momento del nacimiento de su criatura. De entre aquellas que sí lo recuerdan, en el Hospital de Jarrío el 46,6 % señala que sí se encontraba presente el ginecólogo/a u obstetra en el momento del nacimiento, siendo inferior al porcentaje de ocasiones del resultado global (58,5%).

**p\_34. ¿Estaba permitido que una persona de su confianza, estuviera con usted durante el proceso del parto y en el momento del nacimiento de la criatura?** **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, sólo durante la dilatación	28	13,7	13,7	13,7
	Sí, durante la dilatación y el parto	159	77,9	77,9	91,7
	No se permitía	17	8,3	8,3	100,0
	Total	204	100,0	100,0	

Tabla 107: Posibilidad de contar con la presencia de compañía durante el proceso de parto y nacimiento, Hospital de Jarrío



### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, sólo durante la dilatación	772	23,7	23,7	23,7
	Sí, durante la dilatación y el parto	2009	61,7	61,7	85,5
	No se permitía	472	14,5	14,5	100,0
	Total	3253	100,0	100,0	

Tabla 108: Posibilidad de contar con la presencia de compañía durante el proceso de parto y nacimiento

Queda reflejado en los resultados que, en el Hospital de Jarrow, es mayor la proporción de embarazadas que contaba con la posibilidad de la presencia de compañía durante la dilatación o durante todo el parto (91,7 %) con respecto al resultado de la misma cuestión para el conjunto de la población estudiada (85,5 %).

Se analizará el comportamiento de esta variable para el caso de **parto vaginal**, siendo los resultados los que se presentan en la siguiente tabla.

### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, sólo durante la dilatación	15	8,8	8,8	8,8
	Sí, durante la dilatación y el parto	152	89,4	89,4	98,2
	No se permitía	3	1,8	1,8	100,0
	Total	170	100,0	100,0	

Tabla 109: Posibilidad de contar con la presencia de compañía durante el proceso de parto vaginal, Hospital de Jarrow

### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, sólo durante la dilatación	511	19,5	19,5	19,5
	Sí, durante la dilatación y el parto	1942	74,1	74,1	93,6
	No se permitía	169	6,4	6,4	100,0
	Total	2622	100,0	100,0	

Tabla 110: Posibilidad de contar con la presencia de compañía durante el proceso de parto vaginal

De entre las mujeres totales que parieron mediante parto vaginal, el 74,1 % ha indicado que sí contó con la opción de tener la presencia de compañía (una persona de su confianza) durante todo el proceso de parto y nacimiento, mientras en el Hospital de Jarrow este porcentaje es del 89,4 %.



### p\_35. ¿Su acompañante estuvo con Vd. en este proceso del nacimiento?

Esta pregunta solamente fue cuestionada a las mujeres con parto vaginal creando una nueva variable que aporte información más completa a partir de la información de las dos anteriores cuestiones. Las opciones de respuesta que se han confeccionado son las siguientes:

- Partos vaginales que sí estuvo el acompañante
- Partos vaginales que no estuvo
- Partos vaginales que no se permitía estar
- Ns/Nc

#### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí estuvo el acompañante	144	84,7	87,8	87,8
	No estuvo el acompañante	17	10,0	10,4	98,2
	No se le permitía	3	1,8	1,8	100,0
	<b>Total</b>	164	96,5	100,0	
No se acuerda		6	3,5		
<b>Total</b>		170	100,0		

Tabla 111: Presencia de compañía durante el proceso de parto y nacimiento, Hospital de Jarrío

#### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí estuvo el acompañante	2085	79,5	80,7	80,7
	No estuvo el acompañante	331	12,6	12,8	93,5
	No se le permitía	169	6,4	6,5	100,0
	<b>Total</b>	2585	98,6	100,0	
No se acuerda		37	1,4		
<b>Total</b>		2622	100,0		

Tabla 112: Presencia de compañía durante el proceso de parto y nacimiento

De entre aquellas mujeres de Jarrío correspondientes a parto vaginal, el 87,8 % ha confirmado la presencia de un acompañante durante el proceso de parto, siendo más elevado que el peso de las usuarias totales con parto vaginal (80,7 %) que contaron con esa compañía.

De este modo, se confirma la mayor permisión en el Hospital de Jarrío para poder disfrutar de compañía tanto en las clases de preparación al parto como en el proceso de parto analizado en las preguntas 17 y 34 respectivamente.

**p\_36. Inmediatamente después del nacimiento ¿mantuvo el contacto piel con piel con su bebé?**

Esta cuestión no fue contestada por aquellos casos en los que el resultado del parto fue “feto muerto al nacimiento” o “nacido vivo que murió después del nacimiento”.

 **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	178	87,3	89,9	89,9
	No	20	9,8	10,1	100,0
	Total	198	97,1	100,0	
Ns/No lo recuerda		6	2,9		
Total		204	100,0		

Tabla 113: Contacto piel con piel inmediatamente tras el nacimiento de la criatura, Hospital de Jarrío

 **Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2447	75,5	76,0	76,0
	No	771	23,8	24,0	100,0
	Total	3217	99,2	100,0	
Ns/No lo recuerda		25	,8		
Total		3242	100,0		

Tabla 114: Contacto piel con piel inmediatamente tras el nacimiento de la criatura

Al menos tres de cada cuatro madres confirman que inmediatamente después del nacimiento de su criatura pudieron tener contacto piel con piel, siendo todavía mayor, nueve de cada diez, el porcentaje de mujeres del Hospital de Jarrío.

**p\_37. ¿Durante cuánto tiempo mantuvo contacto piel con piel con su criatura inmediatamente después del nacimiento?**

Esta pregunta debía ser contestada exclusivamente por las mujeres que inmediatamente después del nacimiento, tuvieron contacto piel con piel con su hijo o hija.

Además, esta cuestión no fue contestada por aquellos casos en los que el resultado del parto fue “feto muerto al nacimiento” o “nacido vivo que murió después del nacimiento”.



□ **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Menos de 30 minutos	81	45,5	47,4	47,4
	De 30 a 60 minutos	43	24,2	25,1	72,5
	Más de 60 minutos	47	26,4	27,5	100,0
	Total	171	96,1	100,0	
Ns/Nc		7	3,9		
Total		178	100,0		

Tabla 115: Tiempo de contacto piel con piel tras el nacimiento de la criatura, Hospital de Jarrío

□ **Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Menos de 30 minutos	1764	72,1	74,6	74,6
	De 30 a 60 minutos	301	12,3	12,7	87,3
	Más de 60 minutos	300	12,3	12,7	100,0
	Total	2365	96,7	100,0	
Ns/Nc		81	3,3		
Total		2447	100,0		

Tabla 116: Tiempo de contacto piel con piel tras el nacimiento de la criatura

Todas las madres que en la anterior pregunta señalaron que sí tuvieron contacto con su criatura inmediatamente después del nacimiento indicaron en esta ocasión el tiempo que duró dicho contacto piel con piel.

El periodo de tiempo más frecuente, analizado para el Hospital de Jarrío, es el que abarca hasta 30 minutos (47,4 %). A su vez, se observa que en este hospital tuvieron más tiempo de contacto piel con piel la madre y el bebé, dado que el porcentaje que supera los 30 minutos es del 52,6 % frente al 25,4 % del total de hospitales.

**p\_38. En general, pensando en la atención durante el proceso de embarazo y el parto...**

**a. ¿Sintió que se respetó su intimidad?**

□ **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	185	90,7	91,6	91,6
	Casi siempre	12	5,9	5,9	97,5
	Pocas veces	4	2,0	2,0	99,5
	Nunca	1	,5	,5	100,0
	Total	202	99,0	100,0	
Ns/Nc		2	1,0		
Total		204	100,0		

Tabla 117: Valoración del respeto por su intimidad, Hospital de Jarrío



## □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	2645	81,3	82,0	82,0
	Casi siempre	355	10,9	11,0	93,0
	Pocas veces	142	4,4	4,4	97,4
	Nunca	83	2,5	2,6	100,0
	Total	3224	99,1	100,0	
Ns/Nc		29	,9		
Total		3253	100,0		

Tabla 118: Valoración del respeto por su intimidad

La atención recibida durante el proceso de embarazo y parto ha sido valorada en primer lugar, en relación al respeto por la intimidad mostrado. Se observa que el 91,6 % de las mujeres de Jarrío consideran que su intimidad siempre fue respetada, mientras, un tanto por ciento menor, el 2,5 % de las mujeres de Jarrío consideran que su intimidad se respetó “pocas veces” o “nunca”.

Estos resultados se muestran en sintonía con los datos globales de la tabla superior.

### b. ¿Fue tratada con amabilidad y comprensión?

## □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	181	88,7	89,2	89,2
	Casi siempre	16	7,8	7,9	97,0
	Pocas veces	6	2,9	3,0	100,0
	Total	203	99,5	100,0	
Ns/Nc		1	,5		
Total		204	100,0		

Tabla 119: Valoración de la amabilidad y comprensión con la que fue tratada, Hospital de Jarrío

## □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	2433	74,8	75,2	75,2
	Casi siempre	508	15,6	15,7	90,9
	Pocas veces	202	6,2	6,3	97,1
	Nunca	93	2,9	2,9	100,0
	Total	3237	99,5	100,0	
Ns/Nc		16	,5		
Total		3253	100,0		

Tabla 120: Valoración de la amabilidad y comprensión con la que fue tratada

En relación a la valoración vertida en el cuestionario sobre la amabilidad y comprensión en el trato, se detecta un alto peso correspondiente a la valoración positiva de esta cuestión,





siendo un poco superior en el Hospital de Jarrío, ya que el 97 %, de las mujeres de este hospital han indicado que el trato fue amable y comprensivo “casi siempre” o “siempre” durante el proceso de parto y nacimiento, mientras que los datos globales muestran que el 90,9 % de las mujeres opinan de la misma forma.

**c. ¿Cree que se le dio toda la información o las explicaciones que usted necesitó en un lenguaje comprensible?**

**Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	178	87,3	89,4	89,4
	Casi siempre	14	6,9	7,0	96,5
	Pocas veces	6	2,9	3,0	99,5
	Nunca	1	,5	,5	100,0
	Total	199	97,5	100,0	
Ns/Nc		5	2,5		
Total		204	100,0		

Tabla 121: Valoración de la información proporcionada, Hospital de Jarrío

**Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	2421	74,4	75,1	75,1
	Casi siempre	392	12,1	12,2	87,3
	Pocas veces	255	7,8	7,9	95,2
	Nunca	156	4,8	4,8	100,0
	Total	3224	99,1	100,0	
Ns/Nc		29	,9		
Total		3253	100,0		

Tabla 122: Valoración de la información proporcionada

En esta pregunta también se observa una valoración positiva muy elevada en ambos casos respecto a la información y explicaciones proporcionadas durante la atención en el proceso de embarazo y parto (89,4 % siempre y 7 % casi siempre). También, en este caso, existe una mayor satisfacción con la información proporcionada en el área de Jarrío que en los datos conjuntos de los hospitales públicos.

**d. ¿Se sintió Ud. participe en las decisiones acerca de su propio cuidado y el de su criatura?**

Esta cuestión no fue contestada por aquellos casos en los que el resultado del parto fue “feto muerto al nacimiento” o “nacido vivo que murió después del nacimiento”.

### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	178	87,3	90,8	90,8
	Casi siempre	10	4,9	5,1	95,9
	Pocas veces	6	2,9	3,1	99,0
	Nunca	2	1,0	1,0	100,0
	Total	196	96,1	100,0	
	Ns/Nc	8	3,9		
Total		204	100,0		

Tabla 123: Valoración de la participación en las decisiones sobre su cuidado y el de su criatura, Hospital de Jarrow

### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Siempre	2263	69,8	72,1	72,1
	Casi siempre	427	13,2	13,6	85,7
	Pocas veces	241	7,4	7,7	93,4
	Nunca	207	6,4	6,6	100,0
	Total	3139	96,8	100,0	
	Ns/Nc	104	3,2		
Total		3242	100,0		

Tabla 124: Valoración de la participación en las decisiones sobre su cuidado y el de su criatura

En último lugar, se solicitó a las usuarias que indicasen su opinión en relación a la posibilidad de participar de las decisiones sobre su cuidado y el de su criatura; señalando en el 95,9 % de los casos de Jarrow, que “siempre” o “casi siempre” se han sentido partícipes en las decisiones tomadas.

Como sucedía en las preguntas anteriores, el nivel de satisfacción vuelve a ser mayor en Jarrow, ya que en la otra tabla se observa que el 85,7 % de las usuarias de los hospitales públicos del Principado de Asturias “siempre” o “casi siempre” se sintieron partícipes en las decisiones tomadas.

## SECCIÓN D: ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DESPUÉS DEL PARTO

### p\_39. ¿Cuánto tiempo duró la estancia en el hospital después de que su bebé naciera?

Esta pregunta se analiza en función del tipo de parto ya que la estancia en el Hospital tras el parto se encuentra relacionada con esta variable. El número de mujeres que faltan hasta completar la totalidad de las usuarias son aquellas que en la encuesta no señalaron el tiempo de permanencia en el Hospital.



### □ Resultado Hospital

		Tipo de parto		Total	
		Parto vaginal	Parto por cesárea		
Días de estancia en el hospital tras el nacimiento	<2 días	n	8	0	8
		%	4,8%	,0%	4,0%
	2 - 3 días	n	144	2	146
		%	85,7%	6,1%	72,6%
	4 - 5 días	n	15	19	34
		%	8,9%	57,6%	16,9%
	6 - 8 días	n	1	12	13
		%	,6%	36,4%	6,5%
Total	n	168	33	201	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	

Tabla 125: Tiempo de duración de la estancia en el Hospital de Jarrío después del nacimiento en función del tipo de parto

### □ Resultado Global

		Tipo de parto		Total	
		Parto vaginal	Parto por cesárea		
Días de estancia en el hospital tras el nacimiento	<2 días	n	56	0	56
		%	2,1%	,0%	1,7%
	2 - 3 días	n	2256	90	2346
		%	86,5%	14,4%	72,6%
	4 - 5 días	n	247	257	504
		%	9,5%	41,2%	15,6%
	6 - 8 días	n	49	261	310
		%	1,9%	41,8%	9,6%
	>=8 días	n	0	16	16
		%	,0%	2,6%	,5%
Total	n	2608	624	3232	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	

Tabla 126: Tiempo de duración de la estancia en el hospital después del nacimiento en función del tipo de parto

El tiempo indicado por las madres que duró su estancia en el hospital tras el nacimiento del niño o niña ha sido categorizado en los tramos que se presentan en las tablas de resultados.

En la tabla para el Hospital de Jarrío se observa que la estancia más frecuente está entre los 2 y 3 días para los partos vaginales (85,7 %), siendo similar a los datos globales (86,5 %), mientras que la estancia media en el caso de las cesáreas es superior -el 36,4 % permaneció entre 6 y 8 días- al de los datos globales para la misma duración (41,8 %).

Por tanto se observa que tal y como es lógico, la estancia media de las mujeres que han dado a luz mediante cesárea es superior a la señalada por aquellas madres que tuvieron un parto vaginal, sin que se puedan apreciar diferencias significativas entre las distintas áreas.

Para esta variable se ha considerado interesante el estudio cuantitativo de la misma. Para ello se han detectado aquellos casos considerados como atípicos o extremos y se han eliminado del estudio ya que distorsionarían la tendencia normal de los valores.

#### □ Resultado Hospital

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Días que duró su estancia en el hospital después de que su bebé naciera	180	1	4	2,46	,794

Tabla 127: Días que duró su estancia en el Hospital de Jarrío después de que su criatura naciera

#### □ Resultado Global

	N	Mínimo	Máximo	Media	Desv. típ.
Días que duró su estancia en el hospital después de que su bebé naciera	3142	1	7	2,88	1,324

Tabla 128: Días que duró su estancia en el hospital después de que su criatura naciera

El número medio de días de estancia en el Hospital de Jarrío después de que el niño o niña naciera es de 2,46 días, mientras que el de los datos globales, teniendo en cuenta todos los centros médicos estudiados, es de 2,88 días.

### p\_40. Piensa que la duración de su estancia en el hospital fue...

Esta pregunta se analiza en función del tipo de parto ya que un juicio sobre la estancia en el hospital tras el parto puede depender de si ha habido o no intervención quirúrgica. Solamente se tienen en cuenta los casos en que se han emitido un juicio de valor sobre la cuestión, motivo por el que el total de usuarias que aparece en la tabla no corresponde con el de la muestra.

### □ Resultado Hospital

			Tipo de parto		Total
			Parto vaginal	Parto por cesárea	
Valoración de la duración de su estancia en el hospital	Demasiado larga	n	11	3	14
		%	6,6%	9,1%	7,0%
	La adecuada	n	152	30	182
		%	91,0%	90,9%	91,0%
	Demasiado corta	n	4	0	4
		%	2,4%	,0%	2,0%
Total	n	167	33	200	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	

Tabla 129: Valoración del tiempo de estancia en el Hospital de Jarrío en función del tipo de parto

### □ Resultado Global

			Tipo de parto		Total
			Parto vaginal	Parto por cesárea	
Valoración de la duración de su estancia en el hospital	Demasiado larga	n	272	87	359
		%	10,5%	14,1%	11,2%
	La adecuada	n	2166	462	2628
		%	83,7%	74,9%	82,0%
	Demasiado corta	n	149	68	217
		%	5,8%	11,0%	6,8%
Total	n	2587	617	3204	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	

Tabla 130: Valoración del tiempo de estancia en el hospital en función del tipo de parto

En la tabla de resultados del Hospital de Jarrío queda reflejado que para el 91 % de las mujeres su estancia en el hospital tras el parto resultó la adecuada; siendo similar el porcentaje de mujeres que han emitido esta valoración cuyo parto fue vaginal frente al parto por cesárea.

El 9,1 % de las madres que parieron en Jarrío mediante cesárea han valorado su estancia hospitalaria como inadecuada, siendo este porcentaje inferior que el 25,1 % de las madres totales con un parto por cesárea y que se muestran insatisfechas con el tiempo de estancia, bien porque fue demasiado corto o demasiado largo.

## p\_41. La información que recibió sobre su recuperación después del parto fue:

### □ Resultado Hospital



		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Totalmente adecuada	50	24,5	25,0	25,0
	Adecuada	134	65,7	67,0	92,0
	Poco adecuada	14	6,9	7,0	99,0
	Totalmente inadecuada	2	1,0	1,0	100,0
	Total	200	98,0	100,0	
Ns/No lo recuerda		4	2,0		
Total		204	100,0		

Tabla 131: Valoración de la información recibida sobre la recuperación después del parto, Hospital de Jarrío

 Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Totalmente adecuada	587	18,0	18,4	18,4
	Adecuada	1938	59,6	60,9	79,4
	Poco adecuada	445	13,7	14,0	93,4
	Totalmente inadecuada	212	6,5	6,6	100,0
	Total	3182	97,8	100,0	
Ns/No lo recuerda		71	2,2		
Total		3253	100,0		

Tabla 132: Valoración de la información recibida sobre la recuperación después del parto

Se observa que el 2,2 % de las mujeres totales y el 2 % de las de Jarrío no han contestado a esta pregunta. De entre las que sí lo han hecho, la adecuación de la información proporcionada en relación a la recuperación tras el parto ha sido calificada como adecuada/muy adecuada por el 79,4 % de los datos globales y el 92 % de las mujeres de Jarrío.

**p\_42. ¿Ha realizado Vd. alguna visita de control de su propia salud entre la 4 y la 6 semana después del parto en los servicios sanitarios públicos?**

 Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	180	88,2	89,6	89,6
	No	21	10,3	10,4	100,0
	Total	201	98,5	100,0	
Ns/No lo recuerda		3	1,5		
Total		204	100,0		

Tabla 133: Asistencia a controles entre la 4ª y 6ª semana después del parto, Hospital de Jarrío



### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2523	77,6	78,0	78,0
	No	712	21,9	22,0	100,0
	Total	3235	99,4	100,0	
Ns/No lo recuerda		18	,6		
Total		3253	100,0		

Tabla 134: Asistencia a controles entre la 4ª y 6ª semana después del parto

Tal y como queda patente en la tabla de resultados, el 78 % de las madres, entre la semana 4ª y 6ª después del parto realizó un control de su propia salud, siendo este peso superior si se tiene en cuenta exclusivamente a las mujeres de Jarrío, de las cuales, el 89,6 % realizaron tal revisión.

### p\_43. ¿Los y las profesionales le ofrecieron o le dieron consejo sobre contracepción después del parto?

#### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	168	82,4	85,3	85,3
	No	29	14,2	14,7	100,0
	Total	197	96,6	100,0	
Ns/No lo recuerda		7	3,4		
Total		204	100,0		

Tabla 135: Recepción de consejo sobre contracepción después del parto, Hospital de Jarrío

#### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2232	68,6	70,3	70,3
	No	941	28,9	29,7	100,0
	Total	3173	97,5	100,0	
Ns/No lo recuerda		80	2,5		
Total		3253	100,0		

Tabla 136: Recepción de consejo sobre contracepción después del parto



En esta ocasión, el 70,3 % de las mujeres ha señalado que sí recibió información sobre temas de contracepción para después del parto por parte de los y las profesionales que le atendieron, mientras que en el resultado parcial de Jarrío, el 85,3 % recibió esta información.

### SECCIÓN E: CUIDADOS ESPECIALES DE LA CRIATURA

Esta sección no fue contestada por aquellos casos en los que el resultado del parto fue “feto muerto al nacimiento” o “nacido vivo que murió después del nacimiento”.

#### p\_44. ¿Fue su hija/ hijo atendido en una unidad neonatal en el hospital después del nacimiento?

##### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	17	8,3	8,5	8,5
	No	182	89,2	91,5	100,0
	Total	199	97,5	100,0	
	Ns/Nc	5	2,5		
Total		204	100,0		

Tabla 137: Atención de la criatura en la unidad de neonatología después del nacimiento, Hospital de Jarrío

##### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	624	19,2	19,6	19,6
	No	2553	78,7	80,4	100,0
	Total	3177	98,0	100,0	
	Ns/Nc	65	2,0		
Total		3242	100,0		

Tabla 138: Atención de la criatura en la unidad de neonatología después del nacimiento

Del total de nacimientos analizados, el 19,6 % requirió que la criatura fuera atendida en la unidad de neonatología inmediatamente después del nacimiento, por debajo, el 8,5 % de las mujeres que dieron a luz en Jarrío requirieron que su bebé fuera atendido en esa unidad.

Todas las mujeres cuyo hijo o hija no tuvo que ser atendido en la unidad neonatal no debían contestar el resto de las preguntas de la sección; pasando directamente a las Sección F.





### p\_45. ¿Cuánto tiempo estuvo su niño/niña en la atención neonatal?

#### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1 día a menos	9	52,9	52,9	52,9
	De 2-7 días	5	29,4	29,4	82,4
	Más de 7 días	3	17,6	17,6	100,0
	Total	17	100,0	100,0	

Tabla 139: Tiempo de permanencia de la criatura en la unidad de neonatología después del nacimiento, Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1 día ó menos	269	43,2	43,3	43,3
	De 2-7 días	217	34,8	34,8	78,1
	Más de 7 días	136	21,9	21,9	100,0
	Total	623	99,8	100,0	
	Ns/Nc	1	,2		
Total		624	100,0		

Tabla 140: Tiempo de permanencia de la criatura en la unidad de neonatología después del nacimiento

Tal y como se observa en la tabla de resultados globales el tiempo más habitual de permanencia en la unidad de neonatología es de un día o inferior, tiempo que estuvo el 43,3 % de las criaturas atendidas. En la otra tabla de los casos de Jarrío, se observa que este dato es superior alcanzando el 52,9 % de los nacidos.

### p\_46. Mientras su criatura estuvo ingresada en la Unidad Neonatal, ¿pudo Vd. acompañarle?

#### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, estuve ingresada para acompañarla	11	64,7	64,7	64,7
	Pude estar con ella, aunque no ingresada	3	17,6	17,6	82,4
	No estaba permitido visitarla	3	17,6	17,6	100,0
	Total	17	100,0	100,0	

Tabla 141: Posibilidad de acompañar a la criatura en la unidad de neonatología, Hospital de Jarrío

#### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, estuve ingresada para acompañarla	265	42,4	42,6	42,6
	Pude estar con ella, aunque no ingresada	224	35,9	36,0	78,6
	No estaba permitido visitarla	133	21,3	21,4	100,0
	Total	622	99,7	100,0	
	Ns/Nc	2	,3		
Total		624	100,0		

Tabla 142: Posibilidad de acompañar a la criatura en la unidad de neonatología

La posibilidad de acompañar al niño o niña durante el tiempo que éste/a estuvo en la unidad neonatal permaneciendo ingresada con él o con ella, se dio en el 42,6 % de los casos globales, sin embargo, esta cifra es superior si se tienen en cuenta solamente los partos en el Hospital de Jarrío donde el porcentaje alcanza el 64,7 %.

No obstante, conviene señalar que para los casos de Jarrío, la posibilidad de estar con su bebé en la unidad de neonatología sin ingresar en el centro es inferior al porcentaje de los resultados globales (17,6 % frente al 36 % respectivamente).

#### p\_47. Mientras su hija o hijo estuvo en la Unidad de Neonatología, ¿le permitieron alimentarlo/a al pecho o con leche materna?

#### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, le di el pecho	8	47,1	47,1	47,1
	Sí, me saqué la leche con un sacaleches	3	17,6	17,6	64,7
	No, no opté por lactancia materna	3	17,6	17,6	82,4
	No, no se permitía en la unidad	1	5,9	5,9	88,2
	No pudo porque ella o su criatura estaban muy enfermas	2	11,8	11,8	100,0
Total		17	100,0	100,0	

Tabla 143: Posibilidad de alimentar al pecho al niño/a en la unidad de neonatología, Hospital de Jarrío



### Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí, le di el pecho	283	45,3	45,3	45,3
	Sí, me saqué la leche con un sacaleches	89	14,2	14,2	59,5
	No, no opté por lactancia materna	82	13,1	13,1	72,7
	No, no se permitía en la unidad	119	19,0	19,0	91,7
	No pudo porque ella o su criatura estaban muy enfermas	52	8,3	8,3	100,0
	Total	624	100,0	100,0	

Tabla 144: Posibilidad de alimentar al pecho al niño/a en la unidad de neonatología

El contacto con la criatura durante su estancia en la unidad de neonatología también queda plasmado a través de la alimentación; más en concreto se centra el interés en la lactancia materna. En este caso se observa que el 64,7 % de las madres de Jarrío optaron por la misma (el 47,1 % dio el pecho mientras que el 17,6 % se sacó la leche con un sacaleches, ambos superiores a los datos globales del estudio).

Finalmente se muestra que el 5,9 % de las mujeres de Jarrío no pudo optar por esta alimentación ya que no estaba permitido y el 19 % de las mujeres totales no tuvo la posibilidad de dar el pecho por la misma razón.

### p\_48. ¿Cómo valora la información que Usted y su pareja recibieron sobre el motivo de ingreso de su criatura en la Unidad Neonatal?

#### Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Totalmente adecuada/suficiente	9	52,9	52,9	52,9
	Adecuada/suficiente	7	41,2	41,2	94,1
	Totalmente inadecuada/insuficiente	1	5,9	5,9	100,0
	Total	17	100,0	100,0	

Tabla 145: Valoración de la información recibida sobre el ingreso del niño/a en la unidad de neonatología, Hospital de Jarrío



### Resultado Global

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Totalmente adecuada/suficiente	255	40,8	40,8
	Adecuada/suficiente	258	41,4	82,2
	Poco adecuada/suficiente	48	7,7	89,9
	Totalmente inadecuada/insuficiente	63	10,1	100,0
	Total	624	100,0	100,0

Tabla 146: Valoración de la información recibida sobre el ingreso del niño/a en la unidad de neonatología

La información proporcionada en el Hospital de Jarrío sobre el motivo de ingreso en la unidad neonatal es valorada positivamente por el 94,1 % de las usuarias, ya que la consideran como adecuada y suficiente, superando esta cifra a su homóloga (82,2 %) de los datos globales del estudio. Manifiesta, en mayor o menor medida, una opinión contraria al respecto el 5,9 % de las mujeres para las que la información no resultó todo lo adecuada y suficiente que hubieran deseado.

### SECCIÓN F: LA ALIMENTACIÓN DE LA CRIATURA

Esta sección no fue contestada por aquellos casos en los que el resultado del parto fue “feto muerto al nacimiento” o “nacido vivo que murió después del nacimiento”.

#### p\_49. Durante el embarazo, ¿habló con su matrn/a sobre la alimentación de la criatura?

##### Resultado Hospital

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	140	68,6	71,4
	No	56	27,5	100,0
	Total	196	96,1	100,0
	Ns/No lo recuerda	8	3,9	
Total	204	100,0		

Tabla 147: Mujeres que hablaron con su matrona sobre la alimentación de la criatura, Hospital de Jarrío

##### Resultado Global



		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2133	65,8	68,2	68,2
	No	996	30,7	31,8	100,0
	Total	3128	96,5	100,0	
Ns/No lo recuerda		114	3,5		
Total		3242	100,0		

Tabla 148: Mujeres que hablaron con su matrona sobre la alimentación de la criatura

En la tabla de resultados de Jarrío y en la tabla de totales queda reflejado que un 3,9 % y un 3,5 % de las madres no ha señalado si durante su embarazo tuvo alguna conversación con su matrón/a sobre la alimentación de su criatura. De entre aquellas madres que sí aportaron una respuesta, el 71,4 % y el 68,2 % en cada área confirma que a lo largo de su embarazo habló con su matrón/a sobre la alimentación de la criatura. Como se puede apreciar, los resultados se diferencian por 3 puntos porcentuales.

#### p\_50. ¿Le entregaron a Vd. una guía sobre la lactancia materna?

##### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	183	89,7	93,8	93,8
	No	12	5,9	6,2	100,0
	Total	195	95,6	100,0	
Ns/No lo recuerda		9	4,4		
Total		204	100,0		

Tabla 149: Entrega de una guía sobre alimentación materna, Hospital de Jarrío

##### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	2682	82,7	86,2	86,2
	No	431	13,3	13,8	100,0
	Total	3113	96,0	100,0	
Ns/No lo recuerda		130	4,0		
Total		3242	100,0		

Tabla 150: Entrega de una guía sobre alimentación materna



La entrega a las madres de una guía sobre lactancia materna es una práctica totalmente habitual en los hospitales públicos del Principado de Asturias ya que el 86,2 % de las mujeres totales y el 93,8 % de las madres de Jario ha confirmado la recepción de la misma.

**p\_51. Pensando en la alimentación de la criatura recién nacida en el hospital, valore los siguientes aspectos:**

□ **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje
¿Recibió asesoramiento sobre la lactancia materna?	Sí	134	93,1%
	No	4	2,5%
	Ns/Nc	6	4,4%
¿Le recomendaron leche artificial?	Sí	8	5,9%
	No	128	88,7%
	Ns/Nc	8	5,4%
¿Le dieron un biberón (como regalo)?	Sí	7	4,9%
	No	128	89,2%
	Ns/Nc	8	5,9%
¿Le enseñaron a sacarse la leche?	Sí	72	50,0%
	No	57	39,7%
	Ns/Nc	15	10,3%
¿Le enseñaron la postura mejor para amamantar?	Sí	113	78,9%
	No	13	8,8%
	Ns/Nc	18	12,3%
¿Le dieron materiales sobre leche artificial?	Sí	7	4,9%
	No	121	84,3%
	Ns/Nc	16	10,8%
¿Le ayudaron a amamantar?	Sí	107	74,5%
	No	17	11,8%
	Ns/Nc	20	13,7%
¿Le pusieron en contacto con otras madres?	Sí	39	27,0%
	No	82	56,9%
	Ns/Nc	23	16,2%

Tabla 151: Valoración de un conjunto de aspectos relacionados con la alimentación de la criatura recién nacida en el Hospital de Jario

## □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje
¿Recibió asesoramiento sobre la lactancia materna?	Sí	2323	71,6%
	No	797	24,6%
	Ns/Nc	123	3,8%
¿Le recomendaron leche artificial?	Sí	657	20,3%
	No	2463	76,0%
	Ns/Nc	123	3,8%
¿Le dieron un biberón (como regalo)?	Sí	1077	33,2%
	No	2049	63,2%
	Ns/Nc	116	3,6%
¿Le enseñaron a sacarse la leche?	Sí	1193	36,8%
	No	1908	58,9%
	Ns/Nc	141	4,3%
¿Le enseñaron la postura mejor para amamantar?	Sí	1851	57,1%
	No	1231	38,0%
	Ns/Nc	160	4,9%
¿Le dieron materiales sobre leche artificial?	Sí	1021	31,5%
	No	2073	63,9%
	Ns/Nc	148	4,6%
¿Le ayudaron a amamantar?	Sí	1620	50,0%
	No	1471	45,4%
	Ns/Nc	151	4,7%
¿Le pusieron en contacto con otras madres?	Sí	451	13,9%
	No	2623	80,9%
	Ns/Nc	168	5,2%

Tabla 152: Valoración de un conjunto de aspectos relacionados con la alimentación en el hospital de la criatura recién nacida

De la totalidad de aspectos propuestos relacionados con la alimentación de la criatura recién nacida en el Hospital de Jarrío, aquel que se produjo con mayor frecuencia es la recepción de asesoramiento sobre lactancia materna; confirmado por el 93,1 % de las madres. También es notable el peso relativo en cuanto a la mejor postura para amamantar (78,9 %) y la ayuda prestada para dar el pecho a su bebé (74,5 %).

En estos tres aspectos indicados, la valoración de las madres de Jarrío es siempre superior (en torno a los 20 puntos porcentuales) a la opinión que realizan la totalidad de las mujeres del Principado de Asturias.

## p\_52. Durante su estancia en el Hospital, ¿cómo alimentó a su bebé?

### □ Resultado Hospital



		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Con leche materna solamente	131	64,2	65,5	65,5
	Leche materna y biberón	34	16,7	17,0	82,5
	Biberón solamente	35	17,2	17,5	100,0
	Total	200	98,0	100,0	
	No está segura	4	2,0		
Total		204	100,0		

Tabla 153: Alimentación de la criatura durante su estancia en el Hospital de Jarrío

#### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Con leche materna solamente	1264	39,0	40,0	40,0
	Leche materna y biberón	1331	41,1	42,1	82,0
	Biberón solamente	569	17,5	18,0	100,0
	Total	3164	97,6	100,0	
	No está segura	78	2,4		
Total		3242	100,0		

Tabla 154: Alimentación de la criatura durante su estancia en el hospital

Esta pregunta analiza el tipo de alimentación de los niños y niñas durante el tiempo que se permaneció en el hospital después del parto.

A la vista de los resultados, el 2 % de las madres de Jarrío no estaba seguro del tipo de alimentación que siguió su hijo o hija durante el tiempo de estancia en el hospital.

Los resultados obtenidos para las madres que sí han contestado muestran que optó por la lactancia materna en exclusiva el 65,5 % de las mujeres que dieron a luz en Jarrío, por encima de los datos globales donde el 40 % alimentaron a su bebé solamente con leche materna.

Finalmente, la otra diferencia de los datos globales con los de Jarrío es que el 17 % de las mujeres de este Hospital combinaron la alimentación de leche materna con el biberón, sin embargo, teniendo en cuenta todos los hospitales de Asturias, el 42,1 % utilizaron esta forma de alimentación para sus bebés.

#### p\_53. ¿Alguna vez ha dado de mamar a su hija o hijo?

Las mujeres que anteriormente indicaron que bien de forma exclusiva o bien de forma conjunta con el biberón dieron de mamar a su hijo o hija, no respondieron a esta pregunta.





### □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	8	20,5	22,9	22,9
	No	27	69,2	77,1	100,0
	Total	35	89,7	100,0	
	Ns/Nc	4	10,3		
Total		39	100,0		

Tabla 155: Mujeres que han dado de mamar alguna vez a su criatura, Hospital de Jarrío

### □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Sí	112	17,4	20,0	20,0
	No	449	69,4	80,0	100,0
	Total	561	86,8	100,0	
	Ns/Nc	86	13,2		
Total		647	100,0		

Tabla 156: Mujeres que han dado de mamar alguna vez a su criatura

En las tablas de resultados se observa que el 13,2 % de las madres y el 10,3 % de las mujeres de Jarrío no han contestado a esta pregunta, en parte como consecuencia de la no-respuesta proporcionada en la anterior. De entre las madres de Jarrío que sí han contestado, el 22,9 % ha manifestado que en alguna ocasión (al menos una vez) han dado de mamar a su hijo o hija, mientras que el 77,1 % restante corresponde a las madres que nunca han optado por este tipo de alimentación.

Estos datos se muestran parejos a los resultados globales, ya que el 20 % ha indicado que al menos una vez ha dado de mamar a su bebé y el 80 % de las mujeres totales nunca amamantó a su niño o niña.

**p\_54. A la edad de tres meses, ¿qué tipo de alimentación tenía su criatura?****Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Leche materna solamente	134	65,7	67,3	67,3
	Biberón solamente	51	25,0	25,6	93,0
	Leche materna y biberón	14	6,9	7,0	100,0
	Total	199	97,5	100,0	
Ns/No lo recuerda		5	2,5		
Total		204	100,0		

Tabla 157: Tipo de alimentación de la criatura a la edad de 3 meses, Hospital de Jarrío

**Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Leche materna solamente	1655	51,0	52,7	52,7
	Biberón solamente	1141	35,2	36,3	89,0
	Leche materna y biberón	346	10,7	11,0	100,0
	Total	3142	96,9	100,0	
Ns/No lo recuerda		101	3,1		
Total		3242	100,0		

Tabla 158: Tipo de alimentación de la criatura a la edad de 3 meses

Es de interés conocer el tipo de alimentación de la criatura trascurridos tres meses desde su nacimiento en el Hospital de Jarrío y compararlo con los resultados totales. A este respecto, como también se observa en la tabla global de resultados, más de la mitad de los niños y niñas nacidas en Jarrío (67,3 %) se alimentaban de leche materna exclusivamente; mientras que en el 25,6 % de los casos, la alimentación era únicamente de biberón.

Dado que el 74,4 % de los bebés de Jarrío se alimenta con leche materna frente a al 63,7 % de los datos globales, se concluye que a los tres meses el uso de la leche materna para la alimentación es mayor en aquellos bebés que nacieron en el Hospital de Jarrío que en aquellos que nacieron en los hospitales públicos del Principado de Asturias.

**SECCIÓN G: VALORACIÓN GLOBAL DE LA ATENCIÓN****p\_55. En general, ¿cómo calificaría usted la atención recibida durante ...**



## a. el embarazo?

## □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Excelente	86	42,2	42,2	42,2
	Buena	101	49,5	49,5	91,7
	Regular	7	3,4	3,4	95,1
	Mala	9	4,4	4,4	99,5
	Muy mala	1	,5	,5	100,0
	Total	204	100,0	100,0	

Tabla 159: Valoración global de la atención recibida durante el embarazo, Hospital de Jarrío

## □ Resultado Global

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Excelente	982	30,2	30,3	30,3
	Buena	1991	61,2	61,4	91,6
	Regular	163	5,0	5,0	96,6
	Mala	80	2,5	2,5	99,1
	Muy mala	29	,9	,9	100,0
	Total	3245	99,8	100,0	
	Ns/Nc	8	,2		
Total		3253	100,0		

Tabla 160: Valoración global de la atención recibida durante el embarazo

La valoración de la información recibida durante el embarazo es igual de positiva en ambos casos, ya que, el 91,6 % y 91,7 % de los casos la han valorado como buena o excelente. Sin embargo, si se distingue entre estas dos categorías; el 42,2 % en Jarrío la valoran como excelente mientras un porcentaje inferior en las embarazadas totales, el 30,3 %, creen que la atención recibida fue magnífica.

## b. el parto?

## □ Resultado Hospital

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Excelente	137	67,2	67,5	67,5
	Buena	57	27,9	28,1	95,6
	Regular	7	3,4	3,4	99,0
	Mala	2	1,0	1,0	100,0
	Total	203	99,5	100,0	
	Ns/Nc	1	,5		
Total		204	100,0		



Tabla 161: Valoración global de la atención recibida durante el parto, Hospital de Jarrío

□ **Resultado Global**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Excelente	1533	47,1	47,3	47,3
	Buena	1329	40,9	41,0	88,2
	Regular	173	5,3	5,3	93,6
	Mala	115	3,5	3,5	97,1
	Muy mala	94	2,9	2,9	100,0
	Total	3244	99,7	100,0	
	Ns/Nc	9	,3		
<b>Total</b>		3253	100,0		

Tabla 162: Valoración global de la atención recibida durante el parto

En este caso, las calificaciones siguen mostrando una alta satisfacción de las usuarias respecto a la información que se les proporcionó durante el parto, pero con mayores diferencias a favor de la excelencia en el Hospital de Jarrío; el 67,5 % de las madres en este hospital ha contestado que el trato fue exquisito, frente al 47,3 % del conjunto de hospitales.

En esta ocasión, se ha manifestado como insatisfecho el 3,4 % de las usuarias de Jarrío; valorando el cuidado durante el parto como malo o muy malo.

**c. después del parto?**

□ **Resultado Hospital**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Excelente	85	41,7	42,3	42,3
	Buena	95	46,6	47,3	89,6
	Regular	10	4,9	5,0	94,5
	Mala	6	2,9	3,0	97,5
	Muy mala	5	2,5	2,5	100,0
	Total	201	98,5	100,0	
	Ns/Nc	3	1,5		
<b>Total</b>		204	100,0		

Tabla 163: Valoración global de la atención recibida después del parto, Hospital de Jarrío

□ **Resultado Global**



		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Excelente	849	26,1	26,2	26,2
	Buena	1520	46,7	46,9	73,2
	Regular	424	13,0	13,1	86,3
	Mala	231	7,1	7,1	93,4
	Muy mala	214	6,6	6,6	100,0
	Total	3238	99,5	100,0	
	Ns/Nc	15	,5		
Total		3253	100,0		

Tabla 164: Valoración global de la atención recibida después del parto

En relación a la atención y servicio prestado tras el parto, queda patente que las diferencias siguen siendo favorables, por la mayor satisfacción, en el caso de aquellas mujeres que dieron a luz en Jarrío. El 89,6 % de estas usuarias emitieron una opinión positiva al respecto, mientras que para el conjunto de las embarazadas esta proporción se reduce hasta el 73,2 %.

En el otro extremo se observa que para el 5,5 % de las usuarias la atención fue “mala” o “muy mala”, correspondiendo el 13,7 % de la totalidad de las mujeres con la misma valoración del servicio.

#### **p\_56. ¿Hay alguna cosa más que le gustaría añadir acerca de la atención recibida en el proceso de atención a su embarazo, parto y nacimiento?**

En esta pregunta las mujeres tuvieron la posibilidad de anotar todas aquellas observaciones y sugerencias que considerasen oportunas en relación a su proceso de embarazo, parto y nacimiento. Las principales observaciones señaladas, son las que se presentan a continuación:

1. Satisfacción con la atención recibida a lo largo de todo el proceso de embarazo, parto y nacimiento (amabilidad de los distintos profesionales sanitarios, información recibida en todo momento, etc.).
2. Mujeres que dejan constancia de que se han cambiado al Hospital de Jarrío para su atención por el trato recibido y debido a que detectan grandes diferencias con otros centros del Principado de Asturias.
3. Durante el proceso de embarazo y parto, hubo falta de información por parte del personal médico y de enfermería, en relación a aspectos como los cuidados posteriores necesarios para el bebé y las decisiones tomadas.

4. Disconformidad con la amabilidad y el trato recibido durante su estancia en el hospital por parte del personal médico; ya que señalan que en ocasiones hubo poco tacto y falta de capacidad profesional.
5. Deseo de recibir atención por parte de un mismo ginecólogo/a a lo largo de todo el proceso de embarazo. De este modo, se adquiere mayor confianza y mejor conocimiento de la situación particular de cada una de las embarazadas.
6. También se han detectado en menor medida “Otras” observaciones y sugerencias apuntadas por las madres, destacando:
  - Insatisfacción con las clases de preparación del parto: falta de horarios y plazas.
  - Deseo de mejora del sistema de visitas: demasiada gente en algunas habitaciones, falta de horarios para evitar molestias con las entradas y salidas.
  - Carencia de atención en algunos momentos del día por la falta de personal.
  - Desacuerdo en algunas de las decisiones médicas tomadas: prolongación de los tiempos de espera (dilatación), realización de cesárea.
  - Incomodidad de la silla de partos y de la cama de la habitación para las cesáreas.
  - Falta de información sobre la alimentación artificial, por la incidencia en la importancia sobre la lactancia.



## 7. ANEXO: CUESTIONARIO

Buenos días Sra \_\_\_\_\_

En primer lugar permítame que me presente. Mi nombre es.....y la llamo en nombre de la Dirección General de Salud Pública y Participación.

Estamos realizando un estudio sobre la asistencia al embarazo, parto y nacimiento en los Hospitales de Asturias con objeto de mejorar los servicios asistenciales.

Hace unos días la Directora General le habrá enviado una carta personal anunciándole esta llamada y pidiéndole su colaboración para responder unas preguntas sobre su embarazo y parto más reciente.

Seremos lo más breves que sea posible con su ayuda. Gracias de antemano por su atención

### Sección A. Resultado del parto y nacimiento

**PARA LA ENTREVISTADORA:** Esta información viene clasificada en los registros. Rellenar antes de la entrevista. Puede necesitar que complete algún dato

**a) Tipo de parto:** (Si tuvo más de un bebé en esta ocasión, responda acerca del que nació primero.)

- |               |   |  |                          |
|---------------|---|--|--------------------------|
| Parto vaginal | { | Natural  | <input type="checkbox"/> |
|               |   | Utilizando fórceps                                       | <input type="checkbox"/> |
|               |   | Utilizando una ventosa o paleta sobre la cabeza del bebé | <input type="checkbox"/> |
| Por cesárea   | { | Programada   | <input type="checkbox"/> |
|               |   | No programada, se decidió después de llegar al Hospital  | <input type="checkbox"/> |

→ **Tipo de anestesia con que le realizaron la cesárea**

- Con anestesia general
- Con anestesia epidural
- NS/NC

**b) Señale las encuestas en que el resultado haya sido:**

- |  |                          |                       |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Feto muerto al nacimiento                    | <input type="checkbox"/> | } Ver observaciones * |
| Nacido vivo que murió después del nacimiento | <input type="checkbox"/> |                       |
| Nacido vivo con graves defectos              | <input type="checkbox"/> |                       |

\* En estos supuestos inicie la entrevista señalando lo penoso que puede resultar recordar esta circunstancia y trasmita lo importante que resulta para la DGSPyP la respuesta a estas preguntas. Por ejemplo:

*Queremos transmitirle nuestras condolencias... y al mismo tiempo quisiera señalarle lo importante que resulta que Vd. responda a esta encuesta sobre su experiencia, aún entendiendo que esos momentos que pasó hayan sido especialmente duros para Vd. Precisamente por ello, para la DGSP y P resulta de un gran interés recoger sus respuesta al cuestionario y agradeceríamos especialmente su esfuerzo y su colaboración para dedicarnos unos minutos y responder a estas preguntas.*

Además, en estos casos no deberán efectuarse las preguntas 3, 36, 37, 38.d ni las Secciones E y F.

**1. Con respecto a este último parto:**

*Se contempla adelantarse o retrasarse el plazo de 15 días antes o 15 días después de la fecha prevista para el parto, fecha prevista por el/la ginecóloga y que se le ha señalado a la mujer*

- Fue a su tiempo. (Parto a término entre la semana 37 y 42)
- No fue a su tiempo
- a. Se adelantó  Espontáneamente. Fue prematuro espontáneo  
 Me lo provocaron
- b. Se retrasó  Espontáneamente. Fue un retraso espontáneo  
 Me lo provocaron
- NS/NC

**2. ¿Ha tenido algún otro parto anterior?**

- No  Sí Anotar nº partos anteriores \_\_\_\_\_

**3. ¿Cuánto pesó su criatura al nacer?**

*Si tuvo un parto múltiple, conteste esta pregunta en relación al/la que nació primero*

\_\_\_\_\_ Gramos Tratar de saber la cifra lo más exacta posible.

- NS/NC

**Sección B. La atención durante el embarazo****✓ El inicio del embarazo****4. ¿Qué profesional la atendió por primera vez en su embarazo? (Marcar solo una opción)**

- Médica/o de familia  Matrona/on
- Ginecólogo/a  Otro \_\_\_\_\_

**5. Aproximadamente, ¿de cuántas semanas de gestación estaba cuando acudió por primera vez a esta consulta?**

Nº semanas \_\_\_\_\_

- NS/NC

**✓ Los controles en el embarazo**

*Una revisión, control o seguimiento de embarazo es cualquier contacto con un médico/a o matron/a para comprobar el progreso del embarazo.*

**6. El seguimiento de su embarazo fue llevado a cabo:**

- En la sanidad pública (pasar a P. 8)
- En la asistencia privada
- En ambas



No acudí a ningún programa de seguimiento (pasar a P. 8)

7. ¿Cuál fue la principal razón por la que eligió ir a la asistencia privada? *Anotar literal*

8. ¿Qué profesionales le atendieron durante su embarazo y cuántos controles tuvo de cada uno de ellos? *(Sin incluir análisis de sangre o ecografías)*

Matrona N° Controles \_\_\_\_\_

Médica/o de familia N° Controles \_\_\_\_\_

Ginecólogo/a u Obstetra N° Controles \_\_\_\_\_

Otros/as \_\_\_\_\_ N° Controles \_\_\_\_\_

9. Durante el embarazo ¿la atendió siempre la misma persona?

a. Matron/a Sí   
No

b. Ginecólogo/a Sí   
No

10. A su juicio, la información que le dieron los profesionales sanitarios durante su embarazo fue:

Muy adecuada  Adecuada  Poco adecuada  Nada adecuada  Ns/Nc

### ✓ Pruebas prenatales

11. Durante el embarazo, le hicieron alguna de las siguientes pruebas para saber si el feto padecía defectos o malformaciones congénitas? *Posibilidad de señalar más de una opción.*

Ecografías de alta resolución en la semana 12

Amniocentesis (pinchazo en el vientre)

Cribado combinado. Análisis de sangre en la semana 9- 10

No me hicieron ninguna prueba para detectar defectos congénitos *(Pasar a P. 14)*

NO SABE/ NO SE ACUERDA *(Pasar a P. 15)*

12. ¿Le pidieron consentimiento para hacerlas?

Sí  No  NS/No lo recuerda

13. ¿Le dieron información suficiente y tuvo tiempo para tomar la decisión de hacerlas o no?

Sí  No  NS/No lo recuerda

*(Pasar a P. 15)*

14. ¿Por qué razón no le hicieron pruebas para saber si el feto padecía alguna alteración?

No me las propusieron

No quiso hacerlas

Estaba fuera de plazo para hacerlas

Otras \_\_\_\_\_-

No sabe / No lo recuerda

**15. Aproximadamente, ¿cuántas ecografías le hicieron en total, durante su embarazo?**

Número de ecografías \_\_\_\_\_  No sabe / No lo recuerda

**16. Durante su embarazo, ¿acudió a clases de preparación al parto en la sanidad pública?**

Sí  *Pasar a P. 17*

No

**16.b. Motivo por el que no acudió a las clases de preparación al parto**

No lo consideré necesario  *Pasar a P. 18*

No me informaron de esas clases  *Pasar a P. 18*

No había plazas libres  *Pasar a P. 18*

No, porque asistí a clases prenatales privadas  *Pasar a P. 18*

No he asistido por problemas de horarios  *Pasar a P. 18*

**17. Si asistió a las clases ...**

**a. Valore la utilidad que le proporcionaron para el parto y el postparto**

Muy útiles  Útiles  Relativamente útiles  Poco útiles  Nada útiles  Ns/Nc

**b. ¿Tuvo la oportunidad de elegir horario de asistencia a las clases?**

Sí  No  Ns/Nc

**c. Valore la adecuación del horario**

Muy adecuado  Adecuado  Relativamente Adecuado  Poco adecuado  Nada Adecuado  Ns/Nc

**d. ¿Estaba permitida la asistencia de su pareja o alguien de su elección?**

Sí  No  Ns/Nc

## Sección C. El parto y el nacimiento del bebé

### PARA TODAS, SALVO CESÁREA PROGRAMADA

**18. ¿Cómo empezó el proceso del parto?**

De manera natural  Fue inducido o provocado

**19. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo duró su último proceso de parto?**

Horas \_\_\_\_\_ Minutos \_\_\_\_\_

**20. ¿Sabe Vd. si se le aplicó alguna de las siguientes técnicas? *Posibilidad de marcar más de una opción***

Le dieron un gel vaginal

Le rompieron la bolsa de las aguas

Le pusieron un gotero con oxitocina

Ninguna de las anteriores

Ns/Nc

21. Durante el proceso de dilatación anterior al parto, ¿pudo moverse y elegir la posición que le resultaba más cómoda?

Sí, la mayor parte del tiempo

Si, durante algún tiempo

No, tuve que estar en reposo

Ns/Nc

22. ¿Le permitieron beber o comer durante el proceso de dilatación anterior al parto?

Sí, beber y comer

Sólo beber pero no comer

Ni beber ni comer

Ns/Nc

23. Durante el proceso del parto, incluido el expulsivo ¿cree que le proporcionaron el alivio del dolor adecuado?

Sí, totalmente

Solo en determinados momentos

No, porque no fue posible (*falta de tiempo*)

No sabe / No lo recuerda

24. Durante el proceso del parto, incluyendo el expulsivo ¿utilizó o le aplicaron alguna de las siguientes técnicas para aliviar el dolor? *Posibilidad de señalar más de una opción*

Métodos naturales (p.e. respiración, masajes)

Ducha o baño de agua caliente

Gas y aire a través de una mascarilla

Analgésicos o calmantes del dolor

Analgesia Epidural o similar

Otro  Especificar \_\_\_\_\_

No utilizó ni le aplicaron nada para aliviar el dolor

25. ¿Le ofrecieron analgesia epidural?

No  Sí  → La acepté { Sí  No

**SOLO PARA PARTO VAGINAL. CESÁREAS PASAR A P.30**

✓ **El nacimiento del bebé**

26. ¿En qué posición dio a luz a su bebé? *Marcar solo una casilla*

Tumbada con las piernas apoyadas en estribos

Sentada / sentada apoyada en almohadas

De costado

De pie, en cuclillas o de rodillas   
Otro  Anotar \_\_\_\_\_

## 27. ¿Le afeitaron o rasuraron el periné?

Sí  No  No sabe / No lo recuerda

## 28. ¿Le aplicaron un enema o lavativa?

Sí  No  No sabe / No lo recuerda

## 29. En el expulsivo, ¿se le practicó una episiotomía (corte a la entrada de la vulva)?

Sí  No  No sabe / No lo recuerda

✓ **El personal que la atendió****PARA TODO TIPO DE PARTOS**

## 30. La atendió la misma matrona o matrócn durante el proceso de parto y nacimiento?

Sí  No, hubo más

## 31. ¿Conocía al personal sanitario que la atendió en el proceso de parto y nacimiento antes de iniciarse éste?

Solo al ginecólogo/a  Solo a la matrona/on   
A ambos  A ninguno/a

## 32. Señale el grado de confianza que le inspiró el personal que le atendió durante el proceso de parto y nacimiento

Mucha  Bastante  Alguna  Poca  Ninguna  Ns/Nc

## 33. ¿Estaba presente el/la ginecóloga/obstetra en el momento del nacimiento?

Si  No  No se acuerda

## 34. ¿Estaba permitido que una persona de su confianza, estuviera con usted durante el proceso del parto y en el momento del nacimiento de la criatura?

Sí, sólo durante la dilatación   
Sí, durante la dilatación y el parto   
No se permitía  Pasar a P.36

35. ¿Su acompañante estuvo con Vd en este proceso del nacimiento? *No realizar para las cesáreas*

Si  No  No se acuerda

## 36. Inmediatamente después del nacimiento ¿mantuvo el contacto piel con piel con su bebé?

Si   
No  Pasar a P.38



No sabe/ No lo recuerda  **Pasar a P.38**

**37. ¿Durante cuánto tiempo mantuvo contacto piel con piel con su criatura inmediatamente después del nacimiento?**

Menos de 30 minutos  De 30 a 60 minutos  Más de 60 minutos  Ns/Nc

**38. En general, pensando en la atención durante el proceso de embarazo y el parto ...**

**a. ¿Sintió que se respetó su intimidad?**

Siempre  Casi siempre  Pocas veces  Nunca  Ns/No lo recuerda

**b. ¿Fue tratada con amabilidad y comprensión?**

Siempre  Casi siempre  Pocas veces  Nunca  Ns/No lo recuerda

**c. ¿Cree que se le dio toda la información o las explicaciones que usted necesitó en un lenguaje comprensible?**

Siempre  Casi siempre  Pocas veces  Nunca  Ns/No lo recuerda

**d. ¿Se sintió Ud. participe en las decisiones acerca de su propio cuidado y el de su criatura?**

Siempre  Casi siempre  Pocas veces  Nunca  Ns/No lo recuerda

## Sección D. Atención en el hospital después del parto

**39. ¿Cuánto tiempo duró la estancia en el hospital después de que su bebé naciera?**

Número de días \_\_\_\_\_ Horas \_\_\_\_\_

**40. Piensa que la duración de su estancia en el hospital fue ...**

Demasiado larga

La adecuada

Demasiado corta

No está segura / No sabe

**41. La información que recibió sobre su recuperación después del parto fue:**

Totalmente adecuada

Adecuada

Poco Adecuada

Totalmente Inadecuada

No sabe / No lo recuerda

**42. ¿Ha realizado Ud. alguna visita de control de su propia salud entre la 4 y la 6 semana después del parto en los servicios sanitarios públicos?**

Sí  No  No sabe / No lo recuerda



43. ¿Los y las profesionales le ofrecieron o le dieron consejo sobre contracepción después del parto?

Sí  No  No sabe / No lo recuerda

### Sección E. Cuidados especiales de la criatura

44. ¿Fue su hija/ hijo atendido en una unidad neonatal en el hospital después del nacimiento?

Sí  No  *Pasar a Sección F*

45. ¿Cuánto tiempo estuvo su niño/niña en la atención neonatal?

1 día ó menos  De 2-7 días  Más de 8 días

46. Mientras su criatura estuvo ingresada en la Unidad Neonatal, ¿pudo Vd acompañarle?

Sí, estuve ingresada para acompañarla   
Pude estar con ella, aunque no ingresada   
No estaba permitido visitarla

47. Mientras su hija o hijo estuvo en la Unidad de Neonatología, ¿le permitieron alimentarlo/a al pecho o con leche materna?

Sí, le di el pecho   
Si, me saqué la leche con un sacaleches   
No, no opté por lactancia materna   
No, no se permitía en la Unidad   
No pudo porque ella o su criatura estaban muy enfermas

48. ¿Cómo valora la información que Usted y su pareja recibieron sobre el motivo de ingreso de su criatura en la Unidad Neonatal?

Totalmente adecuada/suficiente   
Adecuada/Suficiente   
Poco Adecuada/Suficiente   
Totalmente Inadecuada/Insuficiente   
No sabe / No lo recuerda

### Sección F. La alimentación del bebé (criatura)

49. Durante el embarazo, ¿habló con su matron/a sobre la alimentación de la criatura?

Sí  No  No sabe / No lo recuerda

## 50. ¿Le entregaron a Vd. una guía sobre la lactancia materna?

Sí  No  No sabe / No lo recuerda

## 51. Pensando en la alimentación de la criatura recién nacida en el hospital, valore los siguientes aspectos:

	SI	NO	Ns/Nc
¿Recibió asesoramiento sobre lactancia materna?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Le recomendaron leche artificial?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Le dieron un biberón (como regalo)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Le enseñaron a sacarse la leche?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Le enseñaron la postura mejor para amamantar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Le dieron materiales sobre leche artificial?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Le ayudaron a amamantar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿La pusieron en contacto con otras madres?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

52. Durante su estancia en el Hospital, ¿cómo alimentó a su bebé? *Una sola opción*

- Con leche materna solamente  *Pasar a P.54*
- Leche materna y biberón  *Pasar a P.54*
- Biberón solamente
- No está segura

## 53. ¿Alguna vez ha dado de mamar a su hija o hijo? (Incluso si fue sólo una vez)

Sí  No  No sabe / No lo recuerda

## 54. A la edad de tres meses, ¿qué tipo de alimentación tenía su criatura?

Leche materna solamente  Biberón solamente  Leche materna y biberón

## Sección G. Valoración global de la atención

## 55. En general, ¿cómo calificaría usted la atención recibida durante ...

## a. el embarazo?

Excelente  Buena  Regular  Mala  Muy mala

## b. el parto?

Excelente  Buena  Regular  Mala  Muy mala

## c. después del parto?

Excelente  Buena  Regular  Mala  Muy mala

56. ¿Hay alguna cosa más que le gustaría añadir acerca de la atención recibida en el proceso de atención a su embarazo, parto y nacimiento?

## Sección H. Usted y su familia

57. ¿En qué país nació Vd.?

España

Otro  Anotar país \_\_\_\_\_

↳ ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en España? \_\_\_\_\_ Años

58. Municipio en el que está empadronada. \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

59. ¿Cuál es su estado civil?

Soltera  Casada  Vive en pareja  Viuda  Separada  Divorciada

60. ¿Cuáles son los estudios más altos que ha terminado?

*Debe elegir una única respuesta. La pregunta hace referencia a estudios terminados en el momento actual.*

<p><b>1. Sin estudios o estudios primarios incompletos:</b> Menos de 6 años o cursos de primaria aprobados</p>	
<p><b>2. Estudios primarios completos:</b> 6º EGB aprobado, Certificado de Escolaridad, 6 años o cursos de primaria aprobados</p>	
<p><b>3. Estudios secundarios 1ª etapa:</b> 8º EGB aprobado, Graduado Escolar, Bachillerato Elemental, Formación Profesional de 1º Grado o Ciclos Formativos de Grado Medio aprobados, ESO aprobada, 4 años o cursos de secundaria aprobados.</p>	
<p><b>4. Estudios secundarios 2ª etapa:</b> BUP, Bachillerato Superior, Bachillerato LOGSE, COU, Preu, Formación Profesional 2º Grado o Ciclos Formativos de Grado Superior, 5 o más años o cursos de secundaria aprobados.</p>	
<p><b>5. Estudios universitarios medios</b> Diplomatura, magisterio, arquitectura o ingeniería técnica</p>	
<p><b>6. Estudios universitarios superiores</b> Licenciatura, arquitectura o ingeniería superior, doctorado)</p>	
<p><b>7. Ns/Nc</b></p>	



**61. ¿Cuál es su situación laboral a día de hoy?**

Marcar una respuesta. Preguntar sobre su situación laboral y luego categorizarlo. Se refiere a su situación actual

Trabajando	
Trabajando con baja de tres meses o más	
En desempleo	
Jubilada o pensionista	
Estudiante	
Trabajo doméstico no remunerado	
Realizando sin remuneración trabajos sociales	
Otras situaciones	
Ns/Nc	

Pasarse a P.63

Pasarse a P.63

**62. A continuación nos gustaría que nos diera algunos datos sobre su trabajo actual:**

En caso de ser estudiante preguntar por la persona principal del hogar. En caso de estar buscando empleo, preguntar por la última ocupación. CNO (Clasificación Nacional de Ocupaciones CNO-94) y CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE-93) se rellenan con los códigos de las tarjetas. Marque la ocupación de mayor duración.

Ocupación	Categoría profesional	CNO	Actividad de la empresa	CNAE	Años trabajados	Ocupación de mayor duración

**62\_b ¿Cuál es su situación de empleo laboral o profesional en su actual o última ocupación?**

La pregunta hace referencia únicamente a la situación del empleo actual; si está en paro preguntar por su última ocupación, o por la que él entrevistado/a considere su principal ocupación

Trabajadora por cuenta propia sin asalariados/as	
Trabajadora por cuenta propia con menos de 10 asalariados/as	
Trabajadora por cuenta propia con más de 10 asalariados/as	
Gerente de una empresa con menos de 10 asalariados/as	
Gerente de una empresa con más de 10 asalariados/as	
Capataz, supervisor/a o encargado/a	
Otro tipo de asalariado	
NS/NC	

**MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN****63. ¿Desea Vd realizar algún tipo de comentario sobre la realización de esta encuesta?**

Entrevistadora: por favor, compruebe que ha respondido a todas las preguntas que corresponden a su caso.

